

Resoconto ornitologico per la Regione Emilia-Romagna - Anno 2023

ALESSANDRO PAVESI, CLAUDIO FIORINI, ANDREA RAVAGNANI, ALESSIO FARIOLI, MATTIA BACCI, LUCA BAGNI, ANGELO BATTAGLIA, PIER PAOLO CECCARELLI, ADRIANO DE FAVERI, CARLO GIANNELLA, FRANCO ROSCELLI E ROBERTO TINARELLI

AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV) Via Boccaccio 23, Imola (BO)

Corresponding author: ale.pavesi18@gmail.com

RIASSUNTO

Vengono riportate le osservazioni ornitologiche di maggiore interesse per la Regione Emilia-Romagna, raccolte durante l'anno 2023. Tra gli altri si riportano le osservazioni di specie accidentali a livello regionale (Strolaga maggiore *Gavia immer*, Nibbio bianco *Elanus caeruleus*, Aquila di Bonelli *Aquila fasciata*, Totano zampegialle minore *Tringa flavipes*, Canapino pallido orientale *Iduna pallida*, Lui di Hume *Phylloscopus humei* e Lui di Pallas *Phylloscopus proregulus*) e informazioni sulla nidificazione di alcune specie localizzate o con importanti variazioni di areale e consistenza della popolazione.

Parole chiave: Citizen science, Resoconto ornitologico, Emilia-Romagna.

ABSTRACT

Ornithological report for the Emilia-Romagna Region - Year 2023

The most interesting ornithological observations for the Emilia-Romagna Region, collected during the year 2023, are reported. Among others, we report observations of regional vagrants (Common Loon *Gavia immer*, Black-winged Kite *Elanus caeruleus*, Bonelli's Eagle *Aquila fasciata*, Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*, Olivaceous Warbler *Iduna pallida*, Hume's Leaf-warbler *Phylloscopus humei* and Pallas's Leaf-warbler *Phylloscopus proregulus*) and information on the nesting of some localized species or with important variations in range and population size.

Key words: Citizen Science, Ornithological Report, Emilia-Romagna.

INTRODUZIONE

Il continuo aumento di osservatori e la conseguente mole di dati disponibile permette, oggi, di avere accesso ad una quantità di informazioni ornitologiche superiore rispetto al passato. Ciononostante, l'aumento esponenziale di piattaforme di raccolta dati di citizen science e social network, comporta spesso una dispersione di questi dati che difficilmente possono essere recuperati a distanza di tempo. Scopo di questo resoconto è quello di raccogliere le osservazioni ornitologiche salienti effettuate in Emilia-Romagna nel 2023; tuttavia va ricordato che per alcune specie ed aree geografiche le informazioni non sono da considerarsi esaurienti, non essendo state effettuate ricerche mirate. A livello regionale, resoconti ornitologici hanno preso in considerazione le osservazioni all'inizio degli anni 2000 (GIANNELLA & TINARELLI, 2003, 2004, 2006) e più recentemente nel 2022 (PAVESI *et al.*, 2023a). A livello provinciale raccolte di dati analoghe sono state redatte per il Modenese per il periodo 1985-1995 (RABACCHI, 1989; GIANNELLA *et al.*, 1996) e per il Parmense nel periodo 2004-2024 (<https://www.parmavisiteguidate.it/parmabw/>).

Va sottolineato che nel maggio 2023 le piogge eccezionali, in particolare del 2-3 maggio e del 16-17 maggio, che hanno interessato l'Emilia-Romagna centro-orientale, hanno determinato soprattutto nelle zone umide la sommersione a distanza

di due settimane una dall'altra della quasi totalità dei nidi situati a terra, nei canneti e tra la vegetazione erbacea (AsOER, 2023). Particolarmente colpiti sono stati ardeidi, caradriformi e anatidi, incluse specie maggiormente diffuse quali oca selvatica e gabbiano reale, allo stesso modo anche la colonia di fenicotteri, nelle valli di Comacchio, è stata in buona parte sommersa. Le colonie di laro-sternidi quali gabbiano roseo, sterna comune, fraticello e beccapesci, sono inoltre state colpite da influenza aviaria che ne ha decimato gli individui. Infine si è registrato uno scarso successo riproduttivo anche per gli ardeidi coloniali, colpiti da eventi meteorologici estremi quale grandine e dalla scarsità di risorse trofiche dovuto all'allagamento di campi coltivati.

MATERIALI E METODI

Per la compilazione del resoconto sono stati consultati i dati raccolti durante le attività di monitoraggio svolte da AsOER - Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV, come censimenti mensili degli uccelli acquatici svolti nel comprensorio delle Valli di Comacchio e censimenti degli uccelli acquatici svernanti (IWC), dati inediti degli stessi associati e dalla SOM - Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" e Cisniar - Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, associazioni

che svolgono attività di ricerca e divulgazione. Un numero rilevante di osservazioni è stato ottenuto grazie alla consultazione delle principali piattaforme di raccolta dati di citizen science come Ornitho.it, iNaturalist.org, eBird.org; piattaforme social come Facebook.org o provenienti dai canali EBN Italia (<https://www.ebnitalia.it/>). Non mancano inoltre comunicazioni di osservazioni personali pervenute ai redattori.

Nomenclatura e ordine sistematico sono in accordo con la recente lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani (BACCETTI *et al.*, 2021) nonché con l'ultimo aggiornamento della checklist degli uccelli dell'Emilia-Romagna (PAVESI *et al.*, 2023a), che a loro volta seguono la tassonomia della HBW-BirdLife Checklist (DEL HOYO & COLLAR, 2014, 2016; HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2022).

Sono state prese in considerazione le seguenti categorie per le quali il grado di interesse di ogni singolo dato, considerata l'eterogeneità del territorio regionale, varia in base all'area geografica in cui è stato raccolto:

- Specie nidificanti irregolari e nidificanti regolari in aree geografiche inusuali
- Specie svernanti irregolari o svernanti regolari in aree geografiche inusuali e/o con numeri inusuali.
- Specie nidificanti e svernanti regolari quando vi sono dati aggiornati che descrivono variazioni significative di consistenza e/o distribuzione.
- Specie migratrici irregolari o con numeri inusuali, accidentali, estivi.
- Specie esotiche importate od introdotte.
- Individui con piumaggi aberranti, ibridi, altro che non rientrano nelle categorie precedenti.

Le segnalazioni sono state riportate per esteso (n. individui, località, comune, provincia, data, osservatore/i e/o fonte/i). Nel caso di osservazioni ripetute, generalmente sono indicati solo i segnalatori o i primi osservatori. Se il dato proviene da piattaforme di raccolta dati, queste sono state riportate, dopo il/i nome/i del/degli osservatore/i in forma contratta e tra parentesi quadre come segue: Ornitho.it [O], EBN Italia [E], Facebook [F], eBird [e], inaturalist.org [N], YouTube [Y]. Per quanto riguarda le specie accidentali (A30), a livello regionale, il dettaglio dell'osservazione è seguito da un asterisco (*) se la segnalazione è documentata in modo incontrovertibile.

Per segnalazioni riferite alle località dell' "interno" si intendono quelle effettuate nelle province di Bologna, Modena, Reggio nell'Emilia, Parma e Piacenza, salvo diversamente specificato. Il periodo preso in considerazione per le segnalazioni invernali comprende i mesi di dicembre e gennaio.

Il numero di individui può essere separato da un trattino "-" ad indicare il numero minimo e massimo di individui osservati nel range temporale indicato; analogamente le date di prima e ultima osservazione possono essere separate da "/".

Sono altresì stati abbreviati alcuni termini qui di seguito riportati: coppia/e (cp.), individuo/i (ind.), maschio (m.), femmina (f.), giovane/i (juv.), adulto/i (ad.), immaturo/i (imm.), calendar year (cy.), stima (-), International Waterbird Census (IWC), Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" (SOM) e Cisniar - Centro Italiano Studi Nidi Artificiali (Cisniar).

RISULTATI

Elenco delle osservazioni:

Cigno nero *Cygnus atratus*

1 ind. Vasche ex zuccherificio di Ostellato (FE), 11/15-02 (G. Nassi e P. Venturi [O]); 1 ind. osservato ripetutamente in Piallassa della Baiona, Ravenna (RA), dal 30-03 al 05-05 (S. Brigidi e C. Poiani [O]); 1-2 ind. osservati ripetutamente in Valle Mandriole, Ravenna (RA), dal 02-08 al 22-09 (M. Castellucci, F. Lovisetto, M. Bacci *et al.* [O]); 1 ind. Val Campotto, Argenta (FE), 19-12 (censimenti mensili AsOER).

Cigno reale *Cygnus olor*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 25 ind. il 15-01 e 22 ind. il 15-12 nella Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM, censimenti IWC)

Nidificazioni nelle province più occidentali (MO-RE-PR-PC): nidificazione accertata con una coppia presso le Valli di Fossa, Concordia s/Secchia (MO), maggio (censimenti mensili Cisniar/SOM) e con una coppia presso "Le Meleghine", Finale Emilia (MO), giugno (R. Gemmato [O]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. segnalato ripetutamente l'11-02, il 04-07 e il 05-09 nel SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO) (G. Leoni e A. Ravagnani [O]); 1 ind. Carpi (MO), 12-03 (F. Simonazzi [O]); 5 ind. Oasi Val di Sole, Concordia s/Secchia (MO), 23-04 (censimenti mensili Cisniar/SOM); 1 ind. Bonifica Valle Buschetti, Baricella (BO), 20-10 (M. Bacci); 1 ind. Bacini Azienda Speranza, Budrio (BO), 21-12 (M. Bacci). In tutti i casi riportati si tratta verosimilmente di individui aulighi.

Oca del Canada *Branta canadensis*

2 ind. Cave di Pomposa, Codigoro (FE), 11/28-01 (M. Bacci *et al.*); 1 ind. casse di espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE), 27/28-01 (G. Fontanesi e G. Leoni [O]). 1 ind. osservato ripetutamente insieme ad alcuni ibridi (max. 5 l'01-01) (A. De Faveri).

Oca selvatica *Anser anser*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: nella Bassa Modenese rilevati un totale di 2003 ind. il 13-01 (censimenti IWC), 1297 ind. e 1161 ind. rispettivamente il 16-07 e il 13-08 (censimenti mensili Cisniar/SOM). Nel bolognese fino a 600 ind. in Valle Buschetti, Baricella (BO), 29-12 (M. Bacci).

Oca granaiola *Anser fabalis*

ssp. *rossicus*: 1 ind. Medesano (PR), 14-01/12-02 (G. Gerra, S. Adorni *et al.* [O]); 5 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 05-12 (P. Melandri [O]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Massime concentrazioni per l'interno: 71 ind. Bassa Modenese, 13-01 (censimenti IWC); 64 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 04-03 (L. Tosatti [O]).

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

2 ad. e 2 1cy bonifica del Mezzano-Valle Pega, Comacchio (FE), 09/23-12 (E. Castellucci, M. Castellucci *et al.* [O][E]); 1 ad. nello stesso sito il 29-12 (F. Salvini [O]), probabilmente uno degli individui osservati in precedenza.

Orco marino *Melanitta fusca*

9 ind. foce del Bevano, Ravenna (RA), 06-01 (M. Bacci, R. Beltrami, F. Padovani [O]); 4 ind. Vene di Bellocchio Sud, Ravenna (RA), 15-01 (M. Fenati [O]); 22 ind. litorale di Valle Ancona (FE), 25-02 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 2-3 ind. litorale di Lido di Spina, Comacchio (FE), 16/30-12 (A. Ravagnani *et al.*).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

2 ind. litorale di Lido delle Nazioni, Comacchio (FE), 01-01 (M. Fenati e P. Melandri [O]); 1 ind. foce del Bevano, Ravenna (RA), 06-01 e 11-01 (M. Bacci, G. Assandri *et al.* [O]), 4 ind. Scanno di Goro (FE), 11-01 (M. Bacci, P. Leanza e A. Farioli); 1 ind. litorale antistante le Vene di Bellocchio, Comacchio (FE), 21-04 (censimenti mensili AsOER); 1 ind. litorale antistante le Vene di Bellocchio, Comacchio (FE), 26-05 (censimenti mensili AsOER); 2 ind. litorale di Lido di Spina, Comacchio (FE), 24 e 29-11 (M. Bacci e M. Castellucci [O]); 2 ind. litorale di Valle Ancona, Comacchio (FE), 04/26-12 (P. Melandri *et al.* [O]).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

1 f. Pinarella di Cervia (RA), 29-03 (M. Bacci); 1 ind. "La Partecipanza", Nonantola (MO), 24-11 (D. Sitti [F]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Segnalazioni per l'interno, dove la specie viene osservata irregolarmente: 1 ind. Collecchio (PR), 03/10-01 (R. Carini [O]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 19-12 (G. Leoni [O]).

Concentrazione rilevante: fino a 20 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 07-12 (P. Gigli e M. Parenti [O]).

Segnalazione in periodo inusuale: 2 ind. Goro (FE), 20-09 (censimenti mensili AsOER).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Nidificazioni: coppia con 9 pulli presso l'Oasi di Cronovilla, Traversetolo (PR), 17-03 (M. Cigarini [F]); coppia con 7 pulli presso il Parco Ducale di Parma, 02-04 (A. Ferrari *et al.* [O]); almeno 1 pullo presso le casse di espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE), 22-05 (daviferra [N]); coppia con 7 pulli presso le vasche di ampliamento della Riserva di Torrice (PR), 01-06 (D. Ronconi *et al.* [O]). A Forlì coppia con 4 pulli nel giardino dell'ospedale Pierantoni, gli esemplari provengono da un vicino parco pubblico (M. Bacci e M. Casadei). Nel Bolognese segnalata una coppia con pulli a Castenaso il 7 maggio (R. Tinarelli).

Concentrazioni rilevanti: casse di espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE), 50 ind. 01-01, 34 ind. l'11-01, 68 ind. il 27-01, 40 ind. il 28-01, 36 ind. il 03-03, 80 ind. il 26-12 (G. Fontanesi, L. Tosatti, G. Leoni e M. Nironi [O]); 32 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 10-10 (G. Leoni [O]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Nidificazioni accertate per l'interno: una cp. con 10 pulli presso l'impianto di fitodepurazione "Le Melegghine" di Finale Emilia (MO) (R. Gemmato [O]).

Concentrazioni rilevanti per l'interno (superiori ai 50 ind.): 80 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 24-01 (G. Leoni [O]); 249 ind. Bassa Modenese il 12-03, di cui 51 ind. presso "Le Melegghine", Finale Emilia (censimenti mensili Cisnar/SOM; R. Gemmato [O]).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 1068 ind. il 20-02, 1706 ind. il 24-03, 1014 il 21-04, 1410 il 22-12 (censimenti mensili AsOER).

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. Parco Ducale di Parma, osservato ripetutamente da gennaio a maggio e nuovamente da agosto a dicembre (F. Roscelli); 1 ind. Valli di Novellara (RE), 06-05 (F. Simonazzi [O]); 1 ind. Ripristini Eurovo, Ostellato (FE), 31-07 (G. De Luca [O]); 1 ind. Valle Santa, Argenta (FE), 16-08 (M. Cortemiglia [O]); 1 ind. Torrice (PR), 18-11 (E. Mero *et al.* [O]); in Valle Mandriole, Ravenna (RA) osservato 1 ind. il 2 e il 17-09 (A. Greiner e R. Maistri [O]). Presso le casse di espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE) 2 ind. il 11/28-01, 1 ind. il 04-02, 03-03, 25-03, 11-06, 20-06 e il 26-12 (G. Fontanesi, G. Leoni e M. Nironi [O]). Nel comune di Carpi (MO), osservati ripetutamente 2-3 ind. da marzo a luglio (G. Rossi, P. Nava *et al.* [O])

[F]); 1 ind. Finale Emilia (MO), 11/12-12 (R. Gemmato [O]); 1 ind. segnalato ripetutamente da gennaio ad aprile e da settembre a dicembre nel SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO) (G. Leoni *et al.* [O]).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

Nidificazione: 1 f. con 1 pullo non volante presso Villa Sorra, Castelfranco Emilia (MO), 29-06 (P. Borsari [N]).

Segnalazioni: 1 ind. Valle Dindona, Mesola (DE), 11-01 (S. Brigidi, F. Zucchini, G. Arveda [O]); 1 f. Faenza (RA), 23-02 (M. Bacci); 1-2 ind. bacini dell'Az. Agr. Garusola, Filo di Argenta (FE), 15/18-03 (M. Tassinari *et al.* [O]); 2 ind. Bosco della Mesola (FE), 25-03 (D. Trombin [O]); 1 m. Comacchio (FE), 15-05 (P. Melandri [O]); 1 m. e 1 f. Forlì, 26-05 (P. P. Ceccarelli).

Fistione turco *Netta rufina*

Nidificazione: 9 pulli presso la Cassa Campotto, Argenta (FE), 20-07 (M. Bacci e M. Fenati; censimenti mensili AsOER).

Moriglione *Aythya ferina*

Concentrazioni rilevanti (superiori a 150 ind.): 350 ind. Cassa Campotto, Argenta (FE), 10-03 (M. Fenati [O]); 240 ind. Laghi di Medesano (PR), 08-08 (F. Roscelli); 151 ind. Laghi di Medesano (PR), 22-10 (F. Roscelli); 340 ind. Valle Mandriole, Ravenna (RA), 09-12 (M. Bacci). Concentrazioni rilevanti a livello regionale: 1556 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 20-02 (censimenti mensili AsOER); 1058 nel comprensorio delle Valli di Argenta (FE), 20-07 (censimenti mensili AsOER).

Nidificazioni: nel parmense 1 coppia si è riprodotta presso Torrice (F. Simonazzi [O]) e 1 nidata, composta da 6 pulli, è stata osservata l'08-06 presso l'area naturalistica Cronovilla, Traversetolo (L. Grisendi). Nel modenese 2 coppie si sono riprodotte presso Castelfranco Emilia (G. Leoni [O]). In provincia di Bologna una nidata composta da 5 pulli è stata osservata il 26-06 a Sant'Agata Bolognese (A. Ravagnani), 11 pulli sono stati osservati presso i Bacini di Valle Buschetti, Baricella (M. Bacci). Presso l'Oasi "La Rizza" ed aree attigue, Bentivoglio, rilevate tre nidificazioni rispettivamente con 2, 3 e 4 pulli (D. Bonazzi). In provincia di Ferrara è stata osservata una nidata composta da 4 pulli il 13-07 presso i bacini dell'Az. Agr. Garusola, Filo di Argenta (C. Maria Giorgi [O]) ed una nidata composta da 5 pulli è stata osservata in Valle Bertuzzi, Comacchio (C. Chiari [O]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Concentrazione rilevante a livello regionale: 95 ind. comprensorio Valli di Argenta (FE), 20-07 (censimenti mensili AsOER).

Concentrazione rilevante per l'interno: 41 ind. Bacini di Valle Buschetti, Baricella (BO), 20-10 (M. Bacci).

Nidificazione: 1 cop. con pulli Valle La Comune, Malalbergo (BO), giugno (S. Festi); 8 pulli presso la Cassa Campotto, Argenta (FE), 20-07 (M. Bacci e M. Fenati; censimenti mensili AsOER).

Moretta *Aythya fuligula*

Nidificazioni: 1 f. con 1 pullo presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), luglio (G. Leoni [O]).

Concentrazione rilevante a livello regionale: 149 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 20-02 (censimenti mensili AsOER).

Moretta grigia *Aythya marila*

1 ind. Lago delle Nazioni, Comacchio (FE), 07/28-01 (M. Passarella *et al.* [O]).

Mestolone *Spatula chipeata*

Concentrazione rilevante a livello regionale: 2108 ind. comprensorio Valli di Argenta (FE), 19-12 (censimenti mensili AsOER).

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 499 ind. Bassa Modenese, 12-03 (censimenti mensili Cisnar/SOM); ~300 ind. Torrice (PR), 23-12 (F. Roscelli).

Canapiglia *Mareca penelope*

Nidificazioni al di fuori delle province di Bologna e Ferrara dove la specie nidifica regolarmente: f. con 3 pulli SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 09-05 (E. Marchesini [O]); 1 pullo di pochi giorni SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 19-05 (S. de Feudis [F]); f. con 5 pulli di pochi giorni di vita presso l'area naturalistica di Cronovilla, Traversetolo (PR), 08-06 (L. Grisendi); f. con 9 pulli Oasi LIPU di Torrile (PR), 11-06 (A. Zanichelli [O]).

Concentrazione rilevante a livello regionale: 1958 ind. cassa Campotto, Argenta (FE), 20-07 (censimenti mensili AsOER).

Fischione *Mareca penelope*

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: 372 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 20-02 (censimenti mensili AsOER).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 3922 ind. Bassa Carpigiana (MO), 13-01 (censimenti IWC); 4870 ind. Bassa Modenese, 13-08 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Codone *Anas acuta*

Concentrazione rilevante per l'interno: 30 ind. Oasi "La Francesca", Carpi (MO), 26-02 (A. Orlandi [O]).

Alzavola *Anas crecca*

1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 17-09 con placca nasale applicata a Saint-Hippolyte, Pirenei Orientali, Francia, nel dicembre 2022 (F. Roscelli).

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

Nella Piallassa dei Piomboni, Ravenna (RA), 1 ind. il 25-07 e 1 ind. il 18-12 (F. Sofri e R. Tinarelli [O]); 1 ind. presso la diga foranea di Porto Corsini, Marina di Ravenna (RA), 30-12 (D. de Pasquale [O]). 1 ind. osservato ripetutamente presso il Lago di Spina, Comacchio (FE) e mare antistante a partire dal 07-10 ed osservato fino a fine 2023 (P. Venturi, P. Zerri *et al.* [O]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. Laghi Curiel, Campogalliano (MO), 27-12-2022/29-01-2023 (L. Tosatti [O]; Pavesi *et al.* 2023b).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Segnalazioni per l'interno: 1 ind. casse di espansione dell'Enza, Montechiarugolo (PR), 06-01 (F. Lovisetto e E. Mero [O]); presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 1 ind. l'11-04 e 1 ind. il 03/04-05 (G. Leoni e A. Ravagnani [O]); presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR), 2 ind. il 30-09 e 01-10 (A. Zanichelli e R. Scaccaglia) e 2 ind. il 19-11 (F. Lovisetto [O]); 1 ind. Bacini Valle Buschetti, Baricella (BO), 29-12 (M. Bacci); 1 ind. casse di espansione dell'Enza, Montechiarugolo (PR), 31-12 (F. Simonazzi [O]).

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

Segnalazioni in località inusuali 2 ind. Gatteo Mare (FC), 04-02 (S. Brigidi [O]); 8 imm. Gatteo Mare (FC), 02-03 (S. Brigidi [O]); 21 ind. in volo sul mare presso Riccione (RN), 16-04 (C. Montevocchi [O]); 1 imm. Riserva di Torrile (PR), 06-05 (G. Balestrieri *et al.* [O]); 1 ind. in volo sul mare press Zadina, Cesenatico (FC), 10-09 (S. Brigidi [O]).

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 122 ind. Bentivoglio (BO), 09-09 (B. Riboni [O]); 47 ind. il 23-04, 44 ind. l'08-10 e >95 ind. il 07-11 nel comprensorio delle zone umide della Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 9358 ind. il 24-03, 10055 ind. il 21-04, 9548 il 22-09 (censimenti mensili AsOER).

Il 05-12 è stato organizzato in Emilia-Romagna il censimento dei fenicotteri per il quale sono state indagate le zone umide in cui la specie è risultata regolarmente presente in dicembre e gennaio negli ultimi 10 anni e quelle in cui è stata segnalata negli ultimi 3 mesi, sono stati complessivamente censiti 9955 ind., di cui 8925 adulti, 148 giovani e immaturi e 541 indeterminati.

Fenicottero minore *Phoeniconaias minor*

1 ind. Salina di Cervia (RA), 07-01 (censimenti IWC); presso le Saline di Comacchio (FE), 1 ind. 06/13-05 (A. Amaretti *et al.* [O]) e 1 ind. il 05-12 (M. Bacci); 1 ind. Valle Fossa di Porto (FE), 23-06 (censimenti mensili AsOER).

Colombella *Columba oenas*

Concentrazioni rilevanti (superiori i 100 ind.): ~120 ind. Busseto (PR), 09-02 (A. Sala [O]); 293 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO); 13-12 (R. Gemmato [O]); ~150 Polesine Zibello (PR), 16-12 (F. Roscelli); 700 ind. Baricella (BO), 29-12 (M. Bacci).

Colombaccio *Columba palumbus*

Presso Luzzara (RE)/ Dosolo (MN), il 16-10 dalle 09:50 alle 10:15, conteggiati stormi in migrazione attiva superiori le 20 unità per un totale di circa 5000 individui. Stormi più numerosi composti da 500-2000 ind. (A. Pavesi).

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Concentrazioni rilevanti: presso "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), >135 ind. il 22-08 e >100 ind. il 31-08 (R. Gemmato [O]).

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Massima concentrazione rilevata: >491 ind. Castelnuovo Rangone (MO), 22-10 (L. Tosatti [O]).

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

Segnalazione tardiva: 4 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 01-11 (R. Gemmato [O]).

Rondone pallido *Apus pallidus*

Si conferma la nidificazione della specie nella piazza Cavalli a Piacenza (A. Berlusconi [O]; A. Ambrogio). Nel centro storico di Parma, 1 giovane dell'anno è stato rinvenuto a terra debilitato e consegnato a un centro di recupero (13-7). Successivi controlli nell'area di ritrovamento in settembre e ottobre non hanno rilevato la presenza di ind. adulti, per cui la riproduzione *in loco* non è stata confermata. In provincia di Rimini sono presenti 4 colonie: 20-25 coppie presso l'Ospedale "Infermi" di Rimini, 10-15 coppie presso l'Hotel delle Nazioni, San Giuliano Mare, 10-15 coppie presso la Piazza Cavour nel centro storico di Rimini e 5-10 coppie presso l'Hotel Europa (C. Montevocchi). In provincia di Modena nidificante con 3 nidi presso Sestola, 28-08 (A. Ravagnani). Segnalazione tardiva: 8 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 01-11 (R. Gemmato [O]).

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

1 ind. in sosta brevemente in un giardino presso Faenza (RA), 10-06 (R. Pavan [O]).

Re di quaglie *Crex crex*

1 ind. in canto nel comune di Fanano (MO) il 24-06 (D. Lopez). La presenza di maschi cantori in periodo potenzialmente idoneo alla nidificazione negli ultimi anni in provincia di Piacenza (2008, 2009, 2011 e 2021) e Modena (2020) (Battaglia, 2020; Pavesi *et al.* 2023a) suggeriscono la nidificazione della specie.

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*

1 ind. parzialmente leucistico "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 21-12 (R. Gemmato [O]).

Gru grus grus

Svernamento in località inusuali: max. 14 ind. tra Campagnola Emilia, Fabbrico, Novellara e Reggiolo (RE), da dicembre (M. Zini, A. Loschi *et al.*)

Presenza estiva: 2 ind., di cui 1 inabile al volo, osservati nei mesi estivi durante i censimenti mensili Cisniar/SOM presso le Valli di Mirandola (MO).

Segnalazione precoce: 2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 19-09 (G. Leoni [O]).

Strolaga minore *Gavia stellata*

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: 12 ind. nel tratto di litorale compreso tra Porto Garibaldi e la foce del Reno (FE), 24-03 (censimenti mensili AsOER).

Strolaga maggiore *Gavia immer*

1 ind. foce del Marecchia, Rimini (RN), 03-12 (M. Castellucci, E. Castellucci, R. Corsi *et al.* [O][E]; Nicoli, 2024)*; 1 ind. litorale di Valle Ancona, Comacchio (FE), 21/30-12 (M. Tassinari *et al.* [O][E]; Nicoli, 2024)*; 1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 29-12 (M. Fenati [O]; Nicoli, 2024)*. Si tratta rispettivamente della settima, ottava e nona segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b).

Berta maggiore *Calonectris diomedea*

2 ind. foce del Marecchia, Rimini (RN), 03-12 (R. Corsi [O])

Berta minore *Puffinus yelkouan*

1 ind. litorale di Lido di Spina, Comacchio (FE), 29-11 (M. Tassinari [O]).

Cicogna nera *Ciconia nigra*

Osservazioni in periodo invernale: nel parmense 1 ind. osservato ripetutamente nella Bassa Est nel mese di gennaio (L. Bagni *et al.* [O]); 1 ind. Roccabianca, 15-01 (F. Bianco); 1 ind. Sissa, 10-12 (R. Scaccaglia). Nel bolognese 1 ind. in gennaio e nuovamente in dicembre presso Sant'Agata Bolognese-Crevalcore (A. Ravagnani). Nel ferrarese 1 ind. osservato ripetutamente presso Poggio Renatico dal 5 gennaio al 28 febbraio (P. Melandri *et al.* [O]); 1 ind. nella bonifica del Mezzano, Comacchio il 03-12 (P. Vacilotto [O]) e 1 ind. a Poggio Renatico il 14-12 (P. Melandri [O]).

Spatola *Platalea leucorodia*

Nidificazioni nell'interno: 2 coppie nidificanti nella Riserva Naturale Orientata Parma Morta, Mezzani (PR) (S. Adorni e S. Sereni, Progetto Garzaie); 10 coppie nidificanti a Soragna (PR) (M. Ravasini, Progetto Garzaie). In provincia di Reggio Emilia la specie si conferma come nidificante presso le casse di espansione del Tresinaro, Rio Saliceto, con diverse coppie e viene segnalato un nuovo sito con 1-3 coppie nella garzaia plurispecifica sita nel canile di Castelnovo di Sotto (GLC Reggio Emilia - Carpi). In provincia di Modena rilevate 32 cop. nidificanti suddivise in 5 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie). In provincia di Bologna nidificante con alcune coppie alla Cassa del Quadrone, Medicina, a Crevalcore e con 15 nidi nelle vasche dell'ex zuccherificio A.I.E. di Malalbergo (D. Bonazzi e A. Ravagnani). Concentrazioni rilevanti per l'interno: 121 ind. l'11-06 e 107 ind. il 16-07 nel comprensorio delle zone umide della Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Nidificazioni nell'interno: 2 coppie nidificanti nella Riserva Naturale Orientata Parma Morta, Mezzani (PR) (S. Adorni e S. Sereni, Progetto Garzaie); 12 coppie nidificanti a Soragna (PR) (M. Ravasini, Progetto Garzaie). In provincia di Reggio Emilia 25 coppie si sono insediate nella garzaia plurispecifica presso le casse di espansione del Secchia, Rubiera (GLC Reggio Emilia - Capi). In provincia di Modena rilevate 38 cop. nidificanti suddivise in 3 garzaie (N. Grattini, Pro-

getto Garzaie). Nel bolognese almeno 3 nidi presso le vasche dell'ex zuccherificio A.I.E. di Malalbergo (D. Bonazzi).

Concentrazioni rilevanti: 700 ind. bonifica del Mezzano, Ostellato (FE), 29-01 (M. Passarella [O]); in Valle Zavelea, Comacchio (FE), fino a 1200 ind. il 28-11 (M. Bacci e C. Maria Giorgi) e 2200 ind. il 12-12 (P. Melandri [O]). Nelle Valli di Comacchio fino a 2500 ind. il 15-12 (A. Farioli). Per l'interno, fino a 374 ind. nella Bassa Modenese il 17-11 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

Segnalazioni in località inusuali: 5 ind. Gatteo Mare (FC), 04/28-04 (S. Brighi [O]).

Nidificazioni nell'interno: in provincia di Reggio Emilia la specie si conferma come nidificante presso le casse di espansione del Tresinaro, Rio Saliceto, con diverse coppie e viene segnalato un nuovo sito con 1-2 coppie nella garzaia plurispecifica sita nel canile di Castelnovo di Sotto (GLC Reggio Emilia - Carpi). In provincia di Modena rilevata la presenza in 3 garzaie con un totale di 12 cop. nidificanti (N. Grattini, Progetto Garzaie). In provincia di Bologna >9 nidi presso le vasche dell'ex zuccherificio A.I.E. di Malalbergo (D. Bonazzi).

Concentrazioni rilevanti: 130 ind. Ripristini Eurovo, Ostellato (FE), 30-07 (P. Vacilotto [O]); 80 ind. il 19-02, 57 ind. il 16-07 e 97 ind. il 13-08 nel comprensorio delle zone umide della Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

Presenza tardiva: 2 ind. Oasi LIPU Torrile (PR), 25-04 (A. Zanichelli, R. Scaccaglia e D. Festa [O]), non ricontattati in seguito.

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Segnalazioni invernali: fino a 20 ind. Ostellato (FE), gennaio (P. Melandri, F. Felici e M. Passarella [O]); 5 ind. casse di espansione del Secchia, Campogalliano (MO), 01-01 (G. Fontanesi [O]); 4 ind. Brighella (RA), 01-01 (A. Belosi [O]); 18 ind. tra Isola Serafini e Roncarolo (PC), 06-01 (censimenti IWC); fino a 25 ind. Lido di Volano, Comacchio (FE), gennaio (M. Passarella e L. Lipparini [O]); >20 ind. Jolanda di Savoia (FE), 29-01 (F. Felici [O]); fino a 6 ind. Ostellato (FE), dicembre (P. Melandri e M. Tassinari [O]).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Segnalazioni invernali: 1 ind. Vallette di Ostellato (FE), 10-01 (censimenti IWC); 1 ind. Ostellato (FE), 24/29-01 (P. Melandri e M. Passarella [O]); 1 ind. Jolanda di Savoia (FE), 29-01 (F. Felici [O]); 1 ind. Bentivoglio (BO), 23-12 (M. Caprara [O]).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Concentrazione rilevante: 1234 ind. Bassa Modenese, 15-09 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Airone rosso *Ardea purpurea*

Nidificazioni nell'interno: In provincia di Piacenza sono state censite 25 coppie presso Caorso (A. Battaglia). Nel parmense 7 nidi su alberi ad altezza da 5 a 10 m, con un totale di 18 juv. involati presso Colorno (PR) (F. Simonazzi, Progetto Garzaie). Nel modenese rilevate 3 garzaie, per un totale di 15 coppie nidificanti (N. Grattini, Progetto Garzaie). Segnalazione tardiva: 2 (1cy), Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MN), 17-11 (F. Simonazzi, censimenti mensili Cisniar/SOM).

Airone bianco maggiore *Ardea alba*

Nidificazioni nell'interno: almeno 3 nidi attivi il 23-05 presso la garzaia di Caorso (PC) (A. Battaglia); 1 coppia nidificante presso Montechiarugolo (PR) (M. Gustin, Progetto Garzaie); 1 coppia nidificante a Soragna (PR) (M. Ravasini, Progetto Garzaie); >1 coppia nidificante presso le Casse di Espansione del Torrente Tresinaro, Rio Saliceto (RE) (N. Grattini). In provincia di Modena nidificante in due nuclei con un totale di 14 coppie (N. Grattini, Progetto Garzaie).

Concentrazione rilevante: 130 ind. Bassa Modenese, 13-07 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. osservato ripetutamente in Valle Cona, Comacchio (FE), 14-04/26-09 (F. De Marco, P. Nava *et al.* [O]).

Marangone minore *Microcarbo pygmaeus*

Dati per l'interno: in provincia di Piacenza, dove le segnalazioni note della specie risalgono solamente al 2021 (A. Battaglia), e dopo la probabile nidificazione nel 2022 (Pavesi *et al.*, 2023), nel 2023 viene accertata la nidificazione presso l'Oasi di Pinedo, Caorso, con 11 nidi attivi in una garzaia mista (A. Battaglia). Oltre alla ormai comune presenza lungo il Po la specie è stata osservata anche lungo il Trebbia fino all'altezza delle cave di ghiaia nel comune di Gossolengo (A. Battaglia). In provincia di Parma nidificante in incremento con 12 coppie nidificanti nella Riserva Naturale Orientata Parma Morta, Mezzani (PR) (S. Adorni e S. Sereni, Progetto Garzaie); 10 coppie presso Montechiarugolo (PR) (M. Gustin, Progetto Garzaie); 13 coppie nel Parco del Taro (R. Carini, Progetto Garzaie) e 52 coppie nell'Oasi LIPU di Torrile (A. Zanichelli, Progetto Garzaie). In provincia di Reggio Emilia ha nidificato per la prima volta, con 5-7 coppie, presso le casse di espansione del Secchia, Rubiera (GLC Reggio Emilia - Carpi). In provincia di Modena rilevate 8 cop. nidificanti suddivisi in 2 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie). In provincia di Bologna >15 nidi presso le vasche dell'ex zuccherificio A.I.E. di Malalbergo e >8 nidi in una cava presso Sala Bolognese (D. Bonazzi).

Occhione *Burhinus oedicephalus*

Segnalazioni in località inusuali: 1 ind. Miramare, Rimini, 13-04 (R. Corsi [O]); 1 ind. Coccolia, Ravenna, luglio (M. Bartolucci [F]). Riconfermata la presenza di una coppia in Alta Val Taro, ma senza prove certe di nidificazione (S. Bertè). Concentrazioni in periodo di svernamento: nel greto del fiume Secchia presso Casalgrande-Sassuolo (RE-MO), 27 ind. il 13-01 e 45 ind. il 08-12 (G. Rossi [O]).

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Segnalazioni in località inusuali: 1 ind. fiume Po presso Colorno-Casalmaggiore (PR-CR), 11-04 (S. Balbo [O]); 1 ind. fiume Po presso Luzzara (RE), 05-08 (A. Pavesi); 1 ind. fiume Po presso Mezzani-Sissa-Casalmaggiore (PR-CR), 13/20-08 (S. Balbo e G. Meo [O]).

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Nidificazione nelle province più interne (MO, RE, PR, PC): Presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR) insediatesi 10-15 coppie con nascita di 34 pulli, tutti predati da Ardeidi e ibis sacri (A. Zanichelli); nel modenese 1 coppia presso Carpi (G. Zuffi), 1 coppia presso l'Oasi di riequilibrio ecologico il Torrazzuolo, Nonantola (A. Ravagnani) e 5-6 coppie nelle Valli Mirandolesi, Mirandola (L. Tosatti [O]). Nel reggiano due coppie hanno deposto presso l'Oasi LIPU Celestina, Campagnola Emilia, ma le uova sono state predate da alcuni individui di ibis sacro (Loschi e Peruz, 2023).

Concentrazioni massime per l'interno: 174 ind. presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR) il 21-10 (F. Lovisetto *et al.* [O]); in provincia di Modena il 13-01 rilevati 173 ind. nel SIC-ZPS Manzolino Tivoli (MO-BO) e 135 ind. a Finale Emilia (censimenti IWC), 312 ind. nelle Valli Mirandolesi il 12-03 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 1486 il 21-07, 1520 ind. il 18-08, 1468 il 22-09, 1169 il 27-10 (censimenti mensili AsOER).

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Presenze invernali: 5 ind. Saline di Comacchio (FE), 01-01 (P. Melandri [O]); 4 ind. Comacchio (FE), 14-01 (M. Tassinari [O]); 2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 12-12 (G. Leoni [O]); 3 ind. Saline di Comacchio (FE), 22-12 (F. Simonazzi [O]).

Concentrazione rilevante: 266 ind. Bassa Modenese, 23-04 (censimenti mensili Cisniar/SOM)

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

Segnalazioni in località inusuali (PC, PR, RE, MO, BO): 1 ind. Molinella (BO), 25-03 (F. De Pascalis [O]); 1 ind. Bassa Modenese, 19-09/25-10 (L. Tosatti *et al.* [O]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 19-09 (G. Leoni [O]).

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Concentrazioni rilevanti (superiori ai 300 ind.): fino a 408 ind. Lido Adriano (RA), gennaio-febbraio (A. Ravagnani); circa 300 ind. Soragna (PR), 04-02 (F. Roscelli); presso "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), circa 300 ind. il 12-02 e il 21-12 (R. Gemmato [O]); 317 ind. Bondeno (FE), 15-02 (A. Ravagnani); fino a 450 ind. tra Lido di Dante e Lido di Savio, Ravenna, 18-02 (D. Tarozzi *et al.* [O]); circa 300 ind. Cervia (RA), 28-02 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]).

Piviere tortolino *Eudromias morinellus*

1 ind. monte Cornaccio (MO), 06-05 (F. Gardosi); 6 ind. monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 03-09 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. Langhirano (PR), 08-09 (D. Ronconi [O]); 1 ind. monte Maggiorasca, 12-09 (A. Rinaldi [O]); 1 ind. Poggio Biancarda (FC), 27-09 (M. Bacci); 2 ind. Oasi Val di Sole, Concordia s/Secchia, 30-09 (R. Casari [O]).

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. Cava Gargatano, Piacenza (PC), 08-03 (A. Mucciolo [O]).

Fratino *Charadrius alexandrinus*

Concentrazione massima rilevata: 52 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 26-05 (censimenti mensili AsOER).

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Concentrazione rilevante: 2694 ind. Bassa Modenese, 13-01 (censimenti IWC).

Chiarlo piccolo *Numenius phaeopus*

Segnalazioni in località inusuali (PC, PR, RE, MO) 1 ind. Busseto (PR), 09-04 (F. Roscelli); 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 17-04 (G. Balestreri [O]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 18-04 (A. Ravagnani); 1 ind. fiume Po Colorno-Casalmaggiore (PR-CR), 12-08 (S. Balbo [O]); 2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 09-09 (G. Rossi [O]).

Concentrazione rilevante: 210 ind. Scanno di Goro (FE), 20-09 (M. Fenati, censimenti mensili AsOER).

Chiarlo maggiore *Numenius arquata*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 101 ind. Bassa Modenese, 13-01 (censimenti IWC)

Concentrazioni in periodo inusuale: 47 ind. Valli Mirandolesi (MO), 11-06 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Presenza invernale: 1 ind. Scanno di Goro (FE), 11-01 (M. Bacci e P. Leanza).

Concentrazione massima rilevata: 8 ind. Scanno di Goro (FE), 20-09 (M. Fenati [O]).

Voltopietre *Arenaria interpres*

Segnalazione in località inusuale (al di fuori del litorale e del Delta del Po): 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 22-08 (L. Tosatti [O]).

Combattente *Calidris pugnax*

Segnalazioni invernali: 20 ind. Saline di Cervia (RA), 06-01 (G. Assandri [O]); 5 ind. La Francesa, Carpi (MO); 08-01 (A. Orlandi [O]); 35 ind.

Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 13-01 (R. Annoni [O]); 7 ind. Mezzani (PR), 14-01 (F. Lovisetto e L. Bagni); 1 ind. Casse di Espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE), 16-01 (P. Nava [O]); 5 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 10/18-01 (G. Leoni [O]); 8 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 26-01 (E. Mero [O]); 3 ind. Frassinara, Parma, 29-01 (E. Lovisetto [O]); 1 ind. Jolanda di Savoia (FE), 29-01 (F. Felici [O]); > 5 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 10-12 (L. Bonato [O]); fino a 5 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 12/19-12 (G. Leoni [O]); 42 ind. Mirandola (MO), 15-12 (F. Simonazzi [O]); 3 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 24-12 (S. Zueger [O]). Concentrazione rilevante: 506 ind. Valli Mirandolesi (MO), 12-03 (censimenti mensili Cisniar/SOM)

Gambecchio frullino *Calidris falcinellus*

Presso la Salina di Cervia (RA) 1 ind. il 27-07 (M. Brambilla [O]) e 2 ind. il 04-08 (E. Castellucci e M. Castellucci [O][E]).

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Segnalazione per l'interno, ad esclusione delle province di MO e BO dove la specie viene osservata regolarmente: 2 ind. Laghi di Medesano (PR), 29-09 (F. Roscelli), 1 ind. il 25-08 e 3 ind. il 02-09 presso Mezzani (F. Lovisetto).

Concentrazione rilevante: fino a 160 ind. Saline di Cervia (RA), 04-08 (E. Castellucci [E])

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

Segnalazioni in periodo invernale: 2 ind. Valle Bertuzzi, Comacchio (FE), 11-01 (R. Tinarelli, censimenti IWC); 1 ind. Salina di Cervia (RA), 07-01 (censimenti IWC); 1 ind. Mirandola (MO), 29-12 (L. Tosatti [O]).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Segnalazioni per l'interno: 2 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 09-09 (G. Padovani e L. Tosatti [O]).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Concentrazione rilevante a livello regionale: 1773 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 22-12 (censimenti mensili AsOER).

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Concentrazione rilevante: fino a 450 ind. Saline di Cervia (RA), 04-08 (E. Castellucci e M. Castellucci [E])

Segnalazioni invernali nell'interno: 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 13-01 (censimenti IWC).

Concentrazione in periodo invernale: 25 ind. Salina di Cervia (RA), 06-01 (G. Assandri, censimenti IWC).

Piovanello pettorale *Calidris melanotos*

Presso la Salina di Cervia (RA), osservato 1 ind. il 21-04 (E. Castellucci e M. Castellucci [O][E]; Nicoli, 2023a)*; 1 ind. il 03-08 (E. Castellucci [O][E]; Nicoli, 2023b); 1 ind. il 21-08 (M. Bacci e D. Panaretti [O][E])*; probabilmente si tratta di un individuo diverso dal precedente. Si tratta rispettivamente della quindicesima e sedicesima segnalazione regionale (Pavesi *et al.*, 2023a; Pavesi *et al.*, 2023b).

Croccolone *Gallinago media*

1 ind. vasche ex-zuccherificio di Forlimpopoli (FC), 03/05-05 (M. Bacci e M. Castellucci [O]); 1 ind. ripristini Gaiana Azienda San Giorgio, Comacchio (FE), 13-11 (R. Tinarelli).

Beccaccino *Gallinago gallinago*

Concentrazione rilevante: 155 ind. Bassa Modenese, 20-10 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

Concentrazione rilevante: 8 ind. Jolanda di Savoia (FE), 12-04 (M. Fenati [F]).

Presenze invernali: 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 04 e 26 gennaio (G. Leoni, M. Nironi e P. Venturi [O]); 1 ind. Bonifica del Mantello, Argenta (FE), 21-01 (M. Bacci); 1 ind. Ostellato, Argenta (FE), 30-01 (A. Sorace [O]).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 ind. Salina di Cervia (RA), 06-08 (E. Castellucci, M. Castellucci e C. Montevecchi [O][E]; Nicoli, 2023b); 1 ind. Valle Uccelliera, Comacchio (FE), 16/17-09 (G. Raiser e R. Maistri [O]; Nicoli, 2024).

Totano zampegialle minore *Tringa flavipes*

1 ind. vasche ex zuccherificio di Ostellato (FE), 18-04 (G. Assandri e G. Bazzi [O]; Nicoli, 2023a)* e 1 ind., probabilmente lo stesso, presso le Saline di Comacchio (FE), 19-04/13-05 (E. Ballardini *et al.* [F][O][E]; Nicoli, 2023a; Nicoli, 2023b)*. Si tratta della quarta segnalazione regionale nota (Pavesi *et al.*, 2023a; Pavesi *et al.*, 2023b).

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. Fiumicello (FC), 19-02 (M. Castellucci [O]), individuo in sosta in un laghetto da pesca a circa 650 m slm, prima osservazione per il Parco delle Foreste Casentinesi.

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Segnalazione tardiva (post 15 ottobre): 1 ind. Comacchio (FE), 17-10 (P. Rovatti e A. Zanichelli).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Specie la cui osservazione è frequente nella provincia di Ferrara, con un massimo di 12 ind. osservati nella Bonifica di Valle Isola, Comacchio, 11-04 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]) e 15 ind. osservati nel comprensorio delle Valli di Comacchio il 18-08 (censimenti mensili AsOER). 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 14-07 (L. Tosatti e G. Padovani [O]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 02-09 (A. Ravagnani, G. Leoni *et al.* [O]).

Pernice di mare *Glareola pratincola*

1 ind. Salina di Cervia (RA), 24-04 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 1 ind. ripristini Gaiana Azienda San Giorgio, Comacchio (FE), 30-04 (G. Raiser [O]); 1 ind. Comacchio (FE), 01-05 (P. Melandri, A. de Angelis e L. Dalla Libera [O]); 1 ind. Gorino (FE), 13-06 (R. Tinarelli).

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

Osservazioni nell'interno: presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), osservati 3 ind. il 27-02, 2 ind. il 05-04 e 1 ind. il 30-10 (A. Ravagnani, G. Leoni [O]); 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 21-04 (G. Balestrieri [O]); 1 ind. vasche ex-zuccherificio Forlimpopoli (FC), 04-05 (M. Castellucci [O]); 1 ind. fiume Po Torricella del Pizzo - Torricella di Sissa (CR-PR), 18-08 (S. Balbo [O]); 1 ind. "Laghi Curiel", Campogalliano (MO), 21-04 (G. Fontanesi [O]); fino a 3 ind. presso l'Area Naturalistica "Le Chiesuole", Collecchio (PR), 22-10/18-11 (G. Gerra, R. Carini *et al.* [O]); 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 17-11 (R. Gemmato [O]).

Osservazioni in periodo invernale: 1-2 ind. Valle Ancona, Comacchio (FE), 14-01 e 21-01 (M. Tassinari, P. Venturi e A. Pasqua [O]); 1 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 18-01 (M. Tassinari [O]).

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 04-12 (P. Melandri [O]).

Gabbiano roseo *Larus genei*

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: 569 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), 24-03 (censimenti mensili AsOER).

Gabbiano comune *Larus ridibundus*

Nidificazioni nell'interno: 1 cp. in cova presso "Laghi Curiel", Campogalliano (MO), aprile-giugno (M. Gustin e G. Fontanesi [O]); >1

nido attivo Concordia sulla Secchia (MO), maggio (L. Tosatti [O]); 6 cp. in cova presso i Bacini di Valle Buschetti, Baricella (BO) (M. Bacci); circa 20 cp. con presenza di pulli presso Buda, Medicina (BO) (C. Fiorini).

Concentrazione rilevante: dormitorio di circa 5000 ind. presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), gennaio e dicembre (G. Leoni [O]).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Osservazioni nelle province dell'interno: 1 ind. (2 cy), Laghetto Parco Ducale di Parma, 01-01/01-02 (F. Roscelli), presente dal 19-12-2022 (Pavesi *et al.*, 2023b); 1 ind. (2 cy) fiume Po Colorno - Casalmaggiore (PR-CR), 11-04 (S. Balbo [O]); 1 ind. (3 cy) fiume Po Colorno - Casalmaggiore (PR-CR), 24-04 (S. Balbo [O]); 1 ind. (1 cy), Castelvetro Piacentino (PC), 22-08 (E. Crepet); presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 9 ind. il 07-11 e 1 ind. il 22-11 (G. Leoni [O]).

Gavina *Larus canus*

Segnalazioni nell'interno: 3 ind. presso l'Area Naturalistica "Le Chiesuole", Collecchio (PR), 10-01 (R. Carini [O]), presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 1 ind. il 31-01 e 1 ind. il 31-10 (G. Leoni e A. Ravagnani [O]).

Zafferano *Larus fuscus*

5 ind. Piacenza, 06-01 (A. Battaglia); 2 ind. Monticelli d'Ongina (PC), 22-10 (B. Riboni [O]). Specie osservata regolarmente in tutte le province ad eccezione del Piacentino, dove le segnalazioni sono scarse (Battaglia, 2020).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Nidificazioni nell'interno: In provincia di Piacenza stimate 30-50 coppie nidificanti prevalentemente nel centro storico del capoluogo di provincia, sui tetti di capannoni in zone industriali e su barre di meandro del fiume Po (A. Battaglia). 1 cop. in cova di due uova su una zattera presso Le Chiesuole, Collecchio (PR), nido successivamente abbandonato prima della schiusa (R. Vitullo). Si conferma la presenza di 26 coppie nidificanti in area urbana del comune di Bologna, dopo il recente insediamento in città (R. Tinarelli).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Specie osservata regolarmente, seppur con pochi individui, in tutte le province ad esclusione della provincia di Piacenza nella quale la specie è stata osservata una sola volta. 1 ind. (1cy) Castelvetro Piacentino (PC), 23-11 (E. Crepet).

Fratricello *Sternula albifrons*

Segnalazioni nell'interno: 2 ind. Calendasco (PC), 08-07 (S. Corbellini [O]).

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Osservazioni nella porzione più occidentale della regione (Province di PC, PR, RE): 1 ind. Oasi LIPU Celestina, Campagnola Emilia (RE), 02-08 (A. Loschi); 1 ind. fiume Po Torricella del Pizzo - Torricella di Sissa (CR-PR), 15-08 (S. Balbo [O]).

Nidificazioni: presso i Bacini di Valle Buschetti, Baricella (BO), conteggiati fino a un massimo di 103 ad., almeno 31 nidi e 59 pulli involati (M. Bacci); circa 150 coppie presso Buda, Medicina (BO) (C. Fiorini). Si conferma l'assenza da diversi anni nelle zone vocate e storicamente occupate della provincia di FE, pertanto le nuove colonie insediate nel Bolognese nel 2022 e 2023 risultano l'unico caso di nidificazione in regione.

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Osservazioni rilevanti per l'interno, ad esclusione della pianura orientale bolognese e del Ferrarese, dove la specie è regolare: 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 29-04 (D. de Marchi [O]); 1 ind. Calendasco (PC), 09-06 (S. Corbellini [O]); nelle Valli di Mortiz-

zuolo, Mirandola (MO), 1 ind. il 16-08 e 1 ind. l'01-09 (L. Tosatti [O]); 1 ind. casse di espansione del Secchia, Rubiera (RE), 20-08 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. Finale Emilia (MO), 21-09 (L. Tosatti [O]); 2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 24-09 (A. Ravagnani).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Nidificazione: almeno 108 nidi presso Cassa Campotto, Argenta (FE), 20-07 (M. Bacci e M. Fenati, censimenti mensili AsOER). Altre nidificazioni nell'Azienda Cesari, Budrio (BO), 2 nidi il 07-05, poi sommersi dall'alluvione (R. Tinarelli).

Svernamento: Saline di Comacchio (FE), fino a 4 ind. in gennaio e fino a 9 ind. in dicembre (censimenti mensili AsOER).

Concentrazione rilevante a livello regionale: 193 ind. Campotto, Argenta (FE), 20-07 (censimenti mensili AsOER).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

Concentrazione rilevante: fino a 130 ind. ripristini Gaiana Azienda San Giorgio, Comacchio (FE), 04-05 (G. Bazzi, F. De Pascalis, M. Sampaoli [O]).

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Concentrazione massima rilevata: circa 900 ind. Scanno di Goro (FE), 20-09 (M. Fenati).

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

Mare antistante a Goro (FE), 1 ind. l'01-10 (M. Castellucci e G. Nassi [O][E]; Nicoli, 2024), 1 ind. l'08-10 (M. Fenati e M. Tassinari [O]) e 1 ind. l'11-08 (M. Cargasacchi e R. Storer [O]); >1 ind. Porto Corsini (RA), 30-10 (W. Wellinghausen-Striebel [O]).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

Concentrazione rilevante: >10 ind. mare antistante Goro (FE), 20-09 (M. Fenati [O]); 8 ind. litorale di Comacchio (FE), 27-09 (L. Tosatti [O]).

Presenza invernale: 1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 25-01 (A. Ravagnani).

Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

1 ind. litorale compreso tra Porto Garibaldi e foce del Reno, 21-04 (censimenti mensili AsOER); 1-2 ind. litorale di Comacchio (FE), settembre-ottobre (M. Fenati *et al.* [O]).

Assiolo *Otus scops*

Ricerche mirate, grazie a dispositivi di registrazione passiva, hanno permesso di confermare lo svernamento di alcuni individui: 1 ind. A.R.E. "Il Torrazzuolo", Nonantola (MO), 23-12; 1 ind. Parco delle piscine, San Giovanni in Persiceto (BO), 29-12 (A. Ravagnani).

Gufo reale *Bubo bubo*

Nel piacentino, dopo decenni in cui non si avevano notizie certe sulla presenza della specie, ad esclusione del rinvenimento di un immaturo morto per elettrocuzione nel comune di Piozzano nel 2016 (Battaglia, 2020), nel maggio viene accertata, tramite fototrappolaggio, la presenza di una coppia con probabile trasporto di prede; successivamente nel giugno viene localizzata una seconda coppia in attività canora, riconfermata anche in periodo autunnale (A. Battaglia). Nel parmense 1 ind. ripreso con fototrappola nella Media Val Taro il 05-05 (G. Ubaldi). Udito 1 m. in canto il 02-07 in provincia di Forlì-Cesena, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (C. Maria Giorgi e C. Ciani).

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Osservazione invernale: 1 ind. Argenta (FE), 05-12 (L. Lipparini [O]); 1 ind. Comacchio (FE), 10-12 (G. Speranza *et al.* [O]); 1 ind. nella Tenuta Orsi-Mangelli, Ravenna (RA), 22-12 (M. Costa).

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

1 ind. Sissa (PR), 04/14-12 (G. Meo, M. Mendi *et al.*)*. Si tratta della sesta segnalazione regionale nota (Pavesi *et al.*, 2023b).

Grifone *Gyps fulvus*

4 ind. il 20-04 e 2 ind. il 06-05 presso Passo di Centocroci, Varese Ligure-Albaretto (SP-PR), 20-04 (S. Balbo, A. Mucciolo); 6 ind. in volo tra l'Alpe di Succiso e il monte Casarola, Collagna (RE), 02-06 (G. Vandelli); 1 ind. Prati della Burraia, Santa Sofia (FC), 26-08 (M. Bacci); 1 ind. osservato sul tetto di una casa presso Valle Bertuzzi, Comacchio (FE) il 19-11 e 1 ind., verosimilmente lo stesso, il 22-11 posato in un campo presso Valle Zavelea, Comacchio (P. Melandri [E]).

Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*

Osservazioni per l'interno: 1 ind. (1cy) Valli Finalesi, Finale Emilia (MO), 09-12 (R. Gemmato [O]); 1 ind. Nonantola (MO), 24/28-12 (E. Selmi e D. Sitti [F]), non si esclude si tratti dello stesso individuo osservato nel Modenese il 09-12.

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Nel piacentino, l'individuo nato nel 2019 e dotato di GPS al nido nella zona di Drome, nelle Baronnie (Francia), che nel 2022 è stato osservato costruire il nido con un adulto nell'Appennino Piacentino (Pavesi *et al.*, 2023), si è riprodotto con successo nel 2023 involando un giovane alla fine di luglio (A. Battaglia). La riproduzione di questa femmina avvenuta a circa 300 Km dalla zona natale è uno dei primi casi accertati a così notevole distanza e dimostra lo scambio genetico tra aquile alpine, prealpine e appenniniche. 1 ind. è stato osservato ripetutamente nella bonifica del Mezzano, Comacchio (FE) (AsOER). Si tratta dello stesso individuo rilasciato nel 2022 nel Bolognese (Pavesi *et al.*, 2023a).

Aquila di Bonelli *Aquila fasciata*

1 ind. Appennino Modenese, 13-01 (G. Nini [E][F])* (Fig. 1). Si tratta della quarta segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. fiume Po presso Torricella di Sissa (PR), 22-10 (S. Balbo [O]); 1 ind. Ravenna, 23-10 (M. Nalin [O]); 1 ind. La Francesa, Carpi (MO), osservato il 26-10 e 31-10 (P. Pasini [F]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 28-10 (A. Amaretti [O]); 1-2 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 28-10/16-12 (D. Tedesco *et al.*[O]); 1 ind. Bagnacavallo (RA), 02-11 (M. Castellucci [O]); 1 ind. Fidenza (PR), 11-11 (S. Corradi [O]); 1 ind. Sant'Agata Bolognese (BO), 7/15-12 (A. Ravagnani).

Nel Ferrarese, presso il Bosco della Mesola, osservati ripetutamente almeno 2 ind. da gennaio a marzo e fino a 4 ind. nel periodo ottobre-dicembre (P. Melandri *et al.* [O]).

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Concentrazioni rilevanti: 27 ind. Bassa Modenese, 15-09 (censimenti mensili Cisnari/SOM); 20 ind. Bassa Modenese, 13-01 (censimenti IWC).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 ind. (2cy) Comacchio (FE), 22-04 (C. Maria Giorgi [O]); 1 m. Castiglione di Ravenna (RA), 23-04 (M. Bacci). 1 ind. (1 cy) Polesine Zibello (PR), 4/31-12 (L. Mattarozzi e P. Zucca), l'osservazione di 1 ind. (1 cy) presso Sissa (PR) il 10-12 (A. Bolsi) probabilmente si riferisce allo stesso individuo segnalato a Polesine Zibello.

Astore *Accipiter gentilis*

Osservazioni in zona costiera: 1 ind. Goro (FE), 01-02 (F. Piccolo e A. Bossi [O]); 1 ind. Bosco della Mesola (FE), 02-12 (M. Fenati [O]); 1 ind. Tenuta Orsi-Mangelli, Ravenna, 22-12 (M. Costa, censimenti mensili AsOER).

Svernamento in area planiziale: 1 ind. osservato ripetutamente in gennaio e febbraio presso San Secondo Parmense (PR) (S. Ferrari ed E. Battistini).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

1 ind. (1 cy) Polesine Zibello (PR), 16/17-12 (L. Mattarozzi e M. Ravasini [F]).

Nibbio reale *Milvus milvus*

Presenze invernali: 6-7 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio e Ostellato (FE), gennaio e dicembre (AsOER); 1 ind. Guastalla (RE), 11/20-01-2023 (M. Fontanesi, P. Orlandelli e R. Folloni); 1 ind. Fontanellato (PR), 23-12 (F. Simonazzi [O]).

Nibbio bruno *Milvus milvus*

Nidificazioni: 2 ad. e 3 juv. Tizzano (PR), 25-06 (D. Ronconi [O]); 2 ind. Casse di espansione dell'Enza, Montechiarugolo (PR), aprile e maggio (D. Ronconi e F. Roscelli [O]); >3 juv da poco involati presso Oasi LIPU di Torrile (PR) (S. Balbo); 1 coppia ha involato 2 juv. presso Luzzara (RE) (A. Pavesi); una coppia si è riprodotta presso il SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), involando due giovani (G. Leoni [O], S. Donello).

In provincia di Parma la specie nidifica molto probabilmente anche nel Parco del Taro e lungo il Po (F. Roscelli).

Presenza tardiva: 1 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 13-11 (A. De Faveri e R. Pavan).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. Busseto (PR), 13-12 (M. Ravasini [F]).

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Nella zona collinare piacentina sono stati localizzati almeno tre siti riproduttivi (A. Castellin; L. Cobianchi [F]). Nel Parmense nidificante localizzato con 2-3 cp. in pianura e 1-2 cp. in collina (F. Roscelli). Nel Reggiano almeno una coppia nidificante presso le Valli di Novellara (A. Costetti). In provincia di Modena sono state rilevate 7 cp. nidificanti certe, alle quali si aggiungono 1 cp. probabile e 1 possibile (N. Grattini). In provincia di Forlì-Cesena stimate 6-7 cp. nidificanti (P. P. Ceccarelli, M. Casadei *et al.*). Si possono poi stimare 10-12 cp. nel Bolognese, 15-18 nel Ferrarese e almeno 4 nel Ravennate (R. Tinarelli).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Si riconferma nidificante regolare nel Parco delle Foreste Casentinesi dove la presenza è confermata dagli inizi degli anni '2000 (P. P. Ceccarelli; Ceccarelli *et al.*, 2008) e in provincia di Piacenza (A. Battaglia). Nel Parmense la nidificazione è stata accertata presso Bardi (A. Mari [O]) ed è risultata probabile con due coppie nell'Alta e Media Val Taro (A. Mucciolo, G. Sardella [O]) e con una coppia in Val Baganza (L. Maffezzoli [O]).

In provincia di Reggio Emilia documentato 1 ind. presso l'Abetina Reale, Villa Minozzo (G. Galeotti). In provincia di Modena 2 ind. presso Capanna Tassoni, Fanano, 07-04 (W. Humphreys [O]) e 2 ind. presso il monte Rondinaro, Sestola, 30-09 (G. Rossi [O]).

Picchio rosso minore *Dryobates minor*

Osservazioni in località inusuali: 1 ind. Oasi di riequilibrio ecologico il Torrazzuolo, Nonantola (MO), 13-03 (D. Lopez).

Grillaio *Falco naumanni*

Nidificazione confermata nelle province di PR, MO, BO e FE con un totale regionale di circa 102-123 cp. nel 2023 (A. Berlusconi e M. Morganti; LIFE Falcon).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Nel Parmense > 100 cp. nidificanti (GLC Parma); in provincia di Modena >6 coppie nidificanti nella Bassa Modenese e Carpigiana (A.

Berlusconi e N. Grattini); in provincia di Ferrara confermate almeno 4-5 coppie nella bonifica del Mezzano, Ostellato-Comacchio.

Falco della regina *Falco eleonorae*

1 ind. fiume Po presso Torricella del Pizzo - Torricella di Sissa (CR-PR), 11-06 (S. Balbo [O]); 1 ind. Guiglia (MO), 31-08 (C. Maria Giorgi [O]).

Lanario *Falco biarmicus*

1 ind. Val Marecchia (RN), 06-04 (P. P. Ceccarelli).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Segnalazioni di individui appartenenti alla ssp. *calidus*: 1 ind. Ripristini Eurovo, Ostellato (FE), 08-01 (M. Fenati [O]); 1 ind. Codigoro (FE), 28-01 (F. Felici [O]); 1 ind. Budrio (BO), 29-01 (F. Sofri e R. Tinarelli [O]); 1 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 11-02 (M. Nalin [O]); 1 ind. San Pietro in Casale (BO), 03-12 (D. Campoccia [O]).

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

Nel Parmense segnalazioni ripetute sono riportate per il Parco Ducale di Parma dove la nidificazione di una coppia risulta probabile (F. Roscelli). Nella città di Reggio Emilia la specie è presente in tutti i parchi urbani ma la nidificazione è stata accertata in via Fenulli (L. Artoni) e in via della Canalina (M. Fontanesi). In provincia di Modena la specie è stata segnalata con 1-3 ind. nei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Marano sul Panaro e Maranello ma senza prove certe di nidificazione (G. Leoni, G. Rossi e L. Tosatti [O]). In provincia di Bologna la specie è presente diffusa soprattutto nel capoluogo, dove si riproduce. Nel Ferrarese segnalato occasionalmente nei comuni di Cento e Comacchio, la specie risulta invece ben presente nella città di Ferrara dove sono stati osservati fino a 40 ind. contemporaneamente (P. Melandri [O]).

Averla cenerina *Lanius minor*

Nel Parmense, ultima roccaforte regionale della specie, la popolazione nidificante di circa 8 coppie è concentrata nella Bassa Ovest (M. Ravasini).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. Cervia (RA), 28-04 (M. Parenti [O]); 1 ind. Meldola (FC), 05-05 (C. Danesi [O]); 1 ind. Busseto (PR), 4/11-06 (L. Dalla Libera *et al.* [O]); 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 11-08 (G. Padovani [O]); 2 ind. Scanno di Goro (FE), 17-08 (R. Tinarelli).

Gracchio corallino *Pyrhcorax pyrrhcorax*

1 ind. monte Penna (PR), 23-08 (Sentieri Sport Natura [Y]); 5 ind. monte Cusna, Villa Minozzo (RE), 27-08 (G. Fontanesi [O]). Si tratta rispettivamente della sesta e settima segnalazione regionale post 2000 (Pavesi *et al.*, 2023b).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

5 ind. Luzzara (RE), 20-01 (L. Bagni); 1 ind. Bonifica di Valle Standiana (RA), 05-02 (M. Nalin [O]); 2 ind. Polesine Parmense (PR), 08-02 (D. Ronconi [O]); 8 ind. il 07-11 e 4 ind. il 30-11 presso Zibello (PR) (D. Ronconi [O]).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Viene riportata la prima nidificazione, con l'involto di un giovane, per il Parco della Vena del Gesso Romagnola, presso Co di Sasso (RA) (M. Bacci e C. M. Giorgi).

Cornacchia *Corvus corone*

Cornacchia nera *Corvus corone corone*: 2 ind. Vigolzone (PC), 26-05 (A. Battaglia), periodo inusuale.

In provincia di Parma sverna regolarmente con alcuni singoli individui nel settore di pianura, si segnala 1 ind. nei pressi della località Castelmazzano, Neviano degli Arduini, il 05-02 (D. Ronconi [O]),

in provincia di Reggio Emilia svernante regolare con 1 ind. nella periferia del capoluogo (G. Fontanesi e M. Fontanesi [O]). 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 04-11 (R. Gemmato [O]).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Concentrazioni massime: fino a 7 ind. Saline di Cervia (RA), 21-04/09-05 (E. Castellucci *et al.* [O]); fino a 13 ind. sulla spiaggia di Rimini di Miramare (RN), 06/11-05 (C. Montevicchi e R. Corsi [O]). Osservazione in località inusuale: 1 ind. Poviglio (RE), 21-03 (F. de Palma).

Osservazioni tardive in periodo di nidificazione: 2 ind. Bonifica della Standiana (RA), 08-06 (A. Belosi [O]); 1 ind. Saline di Cervia (RA), 15-06 (V. Benini).

Cappellaccia *Galerida cristata*

Segnalazioni in località inusuali: 1 ind. Langhirano (PR), 20-02 (F. De Palma [O]); 3 ind. in canto a Castelvetto Piacentino (PC), 11-06 (B. Riboni [O]).

Pendolino *Remiz pendulinus*

Presenza in periodo e località idonea alla nidificazione: >1 ind. in maggio e giugno presso la Penisola di Boscoforte, Argenta-Comacchio (FE) (R. Tinarelli).

Basettino *Panurus biarmicus*

Si conferma l'unico sito riproduttivo regolare a livello regionale nelle Valli di Argenta (FE), con la presenza di alcune coppie.

Canapino pallido orientale *Iduna pallida*

1 ind. fotografato e registrato tra il 22 maggio ed il 18 di giugno a Massa finalese, Finale Emilia (MO) (E. Borghi; G. Baroni [O]; Nicoli, 2023b)* (Fig. 2). Si tratta della prima segnalazione regionale della specie, considerando il dato erroneo riportato da Bagni *et al.* (2003) (Pavesi *et al.* 2023b). L'osservazione è stata sottoposta alla COI.

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. Poviglio (RE), 05-03 (F. Bianco).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Concentrazione rilevante: >50 ind. Penisola di Boscoforte, Argenta-Comacchio (FE), 18-08 (F. Sofri e R. Tinarelli [O]).

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus*

Osservazione tardiva: 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 7 e 12-11 (R. Gemmato [O]).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

Osservazione tardiva: 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 29-10 (R. Gemmato [O]).

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), 10-09 (R. Gemmato [O]).

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

1 ind. Miramare di Rimini (RN), 15-05 (R. Corsi [O]); 1 ind. Bazzano (BO), 20-08 (G. Baroni [O]).

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Osservazione planiziale: 2 ind. San Giovanni in Persiceto (BO), 13-03 (A. Farioli).

Topino *Riparia riparia*

Nel Piacentino alcune colonie si sono insediate in alcuni frantoi localizzati lungo il fiume Trebbia, come regolarmente osservato negli ultimi anni; una colonia composta da circa 50 coppie si era insediata in un cumulo di sabbia in un cantiere di inerti e a un controllo suc-



Fig. 1. Aquila di Bonelli (*Aquila fasciata*). Appennino modenese, 13 gennaio 2023. ©Giorgio Nini

cessivo, nel mese di luglio, è risultata distrutta (A. Battaglia). Nel Parmense in totale solo 2-3 colonie nidificanti in frantoi di pietrisco nei pressi del fiume Taro e torrente Parma (F. Roscelli e S. Piccolo [O]). Nel bolognese rilevata una colonia con >20 nidi attivi presso una cava nel comune di Sala Bolognese (D. Bonazzi). Nel Ferrarese, in una cava presso Migliaro, è stata rilevata una colonia ma non ne è stato possibile conteggiare i nidi attivi (M. Bacci, A. Farioli e A. Ravagnani). Osservazione tardiva: 1 ind. Rimini, 29-10 (C. Montevecchi [O][E]).

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*

1 ind. Rimini, 14-10 (C. Montevecchi [O][E])*; 1 ind. Ferrara, 02/05-11 (P. Melandri *et al.* [O][E][e]; Nicoli, 2024)*. Si tratta rispettivamente dell'ottava e nona segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b).

Lui di Hume *Phylloscopus humei*

1 ind. Lido Adriano (RA), 08-01/04-03 (M. Passarella, P. Nava *et al.* [O]), osservato a partire dal 28-12 (Pavesi *et al.*, 2023a)*; 1 ind. Luzzara (RE), 11-02/28-03 (A. Pavesi *et al.*; Nicoli, 2023a)*. Si tratta rispettivamente della terza e quarta segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023a; Pavesi *et al.*, 2023b).

Lui di Pallas *Phylloscopus proregulus*

1 ind. Maranello (MO), 26-01/20-03 (G. Rossi *et al.* [O][E]; Nicoli, 2023a)*. Si tratta della quarta segnalazione regionale (Pavesi *et al.* 2023b).

Lui grosso *Phylloscopus trochilus*

1 ind. documentato in canto, sul versante toscano del M. Sillano (LU), 09-07 (G. Fontanesi). Il dato viene qui riportato considerata la vicinanza al confine regionale.

Lui siberiano *Phylloscopus tristis*

Presso Valle Santa, Argenta (FE), osservato ripetutamente 1 ind., forse lo stesso, il 18-03 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]), 31-03 (M. Tassinari [O]) e 15-04 (G. Bazzi [O]); 1 ind. Argenta (FE), 19/20-03 (M. Benazzo [O]); 1 ind. "Le Meleghine", Finale Emilia (MO), 26-03 (R. Gemmato [O]); 1 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 14 e 22 ottobre (M. Nalin [O]); 1 ind. Porto Corsini (RA), 21-10 (M. Nalin [O]); 1 ind. Luzzara (RE), 28-11 (A. Pavesi); 1 ind. Sissa (PR), 28-12 (F. Lovisetto [O]).

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Vengono riportate le segnalazioni per le province di MO, RE, PR e PC dove la specie risulta tuttora localizzata e per le quali le conoscenze sono scarse. Nel Parmense nidificazione accertata in un'area calanchiva presso Lesignano de' Bagni (PR) (D. Ronconi [O]). 1 ind. rinvenuto morto probabilmente a causa di collisione contro vetrata presso il Centro sportivo di Collecchio (PR) (P. Madelli). Nel Reggiano 1 cp. nidificante certa presso il M. Grafagnana, Vezzano s/C, 19-04/09-05 (G. Galeotti, M. Campani); almeno 2 cp. nidificanti probabili sui colli di Scandiano (RE), 18-03/05-05 (M. Campani, A. Costetti, G. Fontanesi [O]); varie osservazioni autunnali e invernali in un giardino privato presso Ca' de Caroli di Scandiano (F. Anceschi). In provincia di Modena segnalato 1 ind. presso Fiorano Modenese il 22-03 e il 15-11 (G. Rossi [O]).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. Ostellato (FE), 25-04 (R. Corsi [O]).

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

1 ind. rinvenuto morto presso la centrale elettrica di Ligonchio (RE), 09-05 (M. Coviello [F]); 1 ind. rinvenuto morto a causa di impatto con vetrata presso Castiglione dei Pepoli (BO), 20-10 (L. Puglisi [O]); 6 ind. Montinalto (FC), 23-10 (P. P. Ceccarelli e C. M. Giorgi [O]).

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. in canto, area golenale del Po presso Guastalla (RE), marzo-maggio (M. Fontanesi [O]).

Storno roseo *Pastor roseus*

6 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 24-09 (A. Ravagnani); 1 ind. Prato Pozzo, Argenta (FE), 29-05 (P. Melandri [O][E]); >2 ind. Ferrara, 31-05 (M. Tassinari [O]); 1 ind. bonifica di Valle Pega, Comacchio (FE), 02-06 (P. Nava [O]).

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

1 ind. Passo di Centocroci, Varese Ligure-Albareto (SP-PR), 15-04 (E. Mero e F. Lovisetto [O]); 2 ind. Corno alle Scale, Lizzano in Belvedere (BO), 17-09 (M. Caprara); 1 ind. nella Pineta di Cozzano (PR) 1 ind. (1cy) il 16-10 e 1 m. dal 29-10 all' 8-11 (M. R. Lamattina [F]); 1 ind., tra Passo Lama Lite e lago della Bargetana (Comuni del Ventasso (RE), 07-10 (T. Campedelli [O])).

Nidificazione probabile: 1 m. osservato anche in canto nella Foresta di Campigna (FC), 26-04/30-06 (M. Bacci, P. P. Ceccarelli e M. Casadei [O]).

Pettazzurro *Cyanecula svecica*

Presenza invernale: 1 ind. bacini dell'Az. Agr. Garusola, Argenta (FE), 14-01 (M. Bacci). Un individuo era stato segnalato anche l'inverno precedente nello stesso sito (Pavesi *et al.*, 2023a).

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Segnalazione tardiva: 1 m. Bazzano (BO), 24-06 (R. Benassi).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 m. Campagnola Emilia (RE), 24-04 (G. Galeotti); 1 f. Pineta di San Vitale (RA), 13-05 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 1 ind. Monzuno (BO), 12-08 (E. Occhiato [O]); 2 ind. Marina Romea (RA), 20-08 (F. Lovisetto e E. Mero [O]); 1 ind. Riserva Naturale Orientata Parma Morta, Mezzani (PR), 27-08 (F. Lovisetto [O]).

Codirossone *Monticola saxatilis*

Nidificazione probabile in Val Perino, nel Piacentino, dove è stato osservato un maschio in canto il 07-05 (A. Battaglia). Nel Parmense maschi territoriali a Passo del Cavallo Monchio delle Corti, monte Navert e monte Marmagna (Corniglio), e sul monte Prinzerà (Terenzo) (F. Lovisetto, L. Maffezzoli e F. Roscelli) e adulti con imbeccata




Fig. 2. Canapino pallido orientale (*Iduna pallida*). Finale Emilia (MO). 30 maggio 2023. Giorgio Padovani

presso il Groppo di Gorro, Borgo Val di Taro l'01-06 (A. Mucciolo [O]). Nel Reggiano la specie è diffusa negli ambienti adatti in tutto l'Alto Appennino (Villa Minozzo, Comuni del Ventasso) seppur con bassa densità (L. Bagni e G. Fontanesi).

Per le province centro-orientali si riportano: 1 m. Prati della Burraia, Santa Sofia (FC), 28-04 (M. Bacci); 1 f. Pian Cavallaro, Sestola (MO), 09-06 (G. Rossi [O]); 1 ind. monte Cimoncino, Fanano (MO), 25-08 (C. Maria Giorgi [O]).

Passero solitario *Monticola solitarius*

Presenza stabile di una coppia presso il monte Perticara (RN) in periodo riproduttivo (P. P. Ceccarelli); 1 ind. in canto presso il monte Gregorio (RN), 09-06 (S. Brigidi [O]).

Presenze invernali: 1 ind. San Leo (RN), 26-11/31-12 (P. Melandri *et al.* [O]).

Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Segnalazione tardiva: 1 ind. bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 05-11 (M. Nalin [O]).

Sordone *Prunella collaris*

Fino a 4 ind. monte Adone, Sasso Marconi (BO), 29-01/25-02 (M. Caprara); 3 ind. San Leo (RN), 11-11/28-12 (M. Bacci *et al.* [O]); fino a un massimo di 8 ind. presso Perticara (RN), 15-11/30-11 (P. P. Ceccarelli, E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 1 ind. Sasso Balinello, Camugnano (BO), 26-11 (M. Caprara); 12 ind. in una cava dismessa presso Valmozzola (PR), 28-12 (A. Mucciolo [O]); alcuni ind. Lago Patrignano, Fanano (MO), dicembre (S. Sirotti). Si conferma lo svernamento regolare presso la Pietra di Bosmantova, Castelnovo ne' Monti (RE), con un max. di 9 ind. (M. Caprara [O]) il 14-01 e >10 il 29-12 (G. Galeotti). 5 ind. Passo della Volpe, Villa Minozzo (RE), il 03-04 (D. Lopez [O]).

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

1 ind. Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE), 21-01 (F. Gardosi e G. Minelli [E]); 1 ind. monte Ventasso, Collagna (RE), 29-01 (G. Fontanesi [O]); 2 ind. San Leo (RN), 26-11/31-12 (M. Bacci *et al.* [O]).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

Fino a 5 ind. Saline di Cervia (RA), 24-04/09-05 (E. Castellucci, M. Castellucci *et al.* [O]); 1 ind. Passo Centocroci, Varese Ligure-Albareto (SP-PR), 11-05 (S. Balbo [O]).

Calandro maggiore *Anthus richardi*

1 ind. Ravalle, Ferrara, 07-02/04-03 (P. Melandri *et al.* [O][E]; Nicoli,

2023a) e nuovamente 1 ind. nello stesso sito dal 29-11 al 08-12 (P. Melandri *et al.* [O][E]; Nicoli, 2024). Nella bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 1 ind. l'11-02 (F. Piccolo [O]) e 2 ind. il 17-12 (A. de Angelis, L. Dalla Libera, G. Nassi e S. Rizzi [O]).

Cutrettola *Motacilla flava*

Individui appartenenti alle sottospecie *cinereocapilla*, *flava* e *thunbergi* vengono osservate regolarmente sul territorio regionale, mentre altre sottospecie vengono osservate più raramente e, spesso, l'attribuzione sottospecifica non può essere confermata anche in presenza di immagini.

Facilmente riconoscibile è la ssp. *feldegg*, per questo solo le osservazioni di questa sottospecie vengono qui riportate: 2 ind. Comacchio (FE), 18-04 (G. Assandri e G. Bazzi [O]); 1 ind. Penisola di Boscoforte, Argenta-Comacchio (FE), 24-04 (M. Fenati e C. Fiorini); 2 ind. Saline di Cervia (RA), 30-04 (M. Nalin [O]); 1 ind. potenzialmente nidificante in un campo di insalata abbandonato presso i Relitti vallivi di Anita, Argenta (FE), 03-06 (G. Assandri e G. Bazzi [O]).

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

La distribuzione della specie a livello regionale resta lacunosa, soprattutto nella sua porzione occidentale. In provincia di Piacenza la specie è nidificante regolare, seppur scarsa, nel settore collinare e montano (A. Battaglia). In provincia di Parma la nidificazione è stata accertata nella Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Ghirardi, Borgo Val di Taro, con l'osservazione di 1 juv. e 2 ad. il 07-07 (F. Lovisetto [O]). Osservazioni in periodo inusuale: 1 ind. inanellato presso Brisighella (RA), 15-07 (M. Bacci e R. Beltrami); 1 ind. in canto presso il parco della Tenuta Riviera, Guastalla (RE), 14-06 (A. Pavesi).

Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrurus*

1 ind. in alimentazione in una mangiatoia presso l'abitato di Rio Saliceto (RE), 18-12 (V. Barbieri [F]; Nicoli, 2024)*. Si tratta della terza segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b).

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Segnalazioni planiziali: inanellati presso l' A.R.E. "Il Torrazzuolo", Nonantola (MO), 1 f. il 05-11 e 1 m. il 25-11 (E. Selmi, L. Conventi, A. Zoboli) e nuovamente 1 ind. il 23-12 (D. Lopez [O]).

Organetto *Acanthis flammea*

Fino a 14 ind. spiaggia di Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 25-11/28-12 (A. Amaretti *et al.* [O]).

Lucherino *Spinus spinus*

Segnalazioni in periodo riproduttivo/estivo: 1 ind. Foresta di Campigna (FC), 30-06 (M. Bacci); 1 ind. Castrocaro Terme (FC), 28-07 (M. Bacci)

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

1 ind. Zibello (PR), 22-11 (P. Panni, OglioPoNews); 1 ind. foce del Bevano, Ravenna, 25-11 (M. Cazzanti); 1 ind. foce del Marecchia, Rimini, 01-12 (C. Montevicchi [O][E]; Nicoli, 2024)

Ortolano *Emberiza hortulana*

A livello regionale è nidificante localizzato e in declino. I territori occupati si trovano prevalentemente nella fascia di Basso Appennino centro occidentale. Nel Parmense alcuni maschi in canto in zone calanchive di Val Parma e Val Taro (F. Roscelli). Nel Reggiano 1 m. in un'area calanchive nel comune di Viano (M. Campani [O]). Nel Modenese alcuni cantori nei comuni di Pavullo nel Frignano e Marano sul Panaro.

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Alcuni maschi in canto presso il Passo di Centocroci, Varese Ligure-Albareto (SP-PR) (F. Lovisetto *et al.*); almeno 2 coppie nidificanti sul monte Fumaiolo, Verghereto (FC) (M. Bacci e C. M. Giorgi [O]);

in provincia di Modena alcune coppie nidificano a Pian de Lagotti, Sestola e Fanano (A. Ravagnani).

Zigolo minore *Emberiza pusilla*

1 ind. Ponticello, Castelvetro piacentino (PC), 10-04 (E. Crepet, 2023; Nicoli, 2023a).

SPECIE INCLUSE NELLA CATEGORIA AERC "E" (cfr. Baccetti *et al.*, 2014)

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 08-02/09-03 (P. Gigli, P. Venturi *et al.* [O]); 2 ind. Valle Santa, Argenta (FE), 19-02/15-04 (F. Pino, L. Lipparini *et al.* [O]); 1 ind. "La Francesa", Carpi (MO), settembre-ottobre (A. Orlandi, P. Nava [O]), 1 ind. Bassa Modenese, 12/23-12 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Oca dell'Orinoco *Neochen jubata*

1 ind. Massa Fiscaglia (FE), 29-01 (M. Passarella [O]).

Oca di Magellano *Chloephaga picta*

2 ind. "Laghi Curiel", Campogalliano (MO), 19-03 (M. Fontanesi [O]).

Casarca sudafricana *Tadorna cana*

1 m. presso Valle Mandriole, Ravenna (RA), giugno e 21-08 (E. Ballardini [F]; P. Nava [O]).

Anatra muta *Cairina moschata*

La presenza della specie in stato di libertà o semilibertà è stata rilevata in tutte le province. Le osservazioni si riferiscono generalmente a singoli individui o gruppi composti da 2-4 ind. Nessun caso di riproduzione è stato accertato.

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

1 f. Ferrara, 24-10/02-12 (P. Melandri [O]).

Anatra sposa *Aix sponsa*

Presso Correggio (RE) 1 m. e 2 f. il 06-01 e 5 ind. il 13-01 (L. Bagni); presso Fossanova San Biagio, Ferrara, 3 ind. il 07-03 e 4 ind. il 14-10 (P. Melandri [O]); 1 ind. Faenza (RA); 09-04 (L. Artoni [O]); 1 m. imbrancato con Germani reali, Vene di Bellocchio Sud, Ravenna (RA), 24-11 (M. Bacci; censimenti mensili AsOER).

Fischione del Cile *Mareca sibilatrix*

1 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), 2/12-04 (P. Nava, D. Sciandra [O]); 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 10/25-04 (A. Ravagnani); 1 ind. Bosco della Mesola (FE), 03-12 (P. Vacilotto [O]).

Spatola africana *Platalea alba*

1 ind. Argenta (FE), 20-07 (censimenti mensili AsOER).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. Bologna, 09-04 (R. Falzoni [O]); 1 ind. Argenta (FE), 24-10 (A. Ravagnani).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

1 ind. Budrio (BO), 14-03 (R. Falzoni [O]).

Parrocchetto di Alessandro *Palaeornis eupatria*

Si riconferma la presenza nella città di Reggio nell'Emilia con l'osservazione ripetuta di 1 ind. nella periferia nord-ovest (M. Fontanesi [O]) e l'osservazione di 2 ind. (di cui 1 f. in mutazione verde diluito) nella periferia sud-est (S. Manfredini).

IBRIDI

Oca selvatica *Anser anser* x oca indiana *Anser indicus*

2 juv. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 06-04 e 14-04 (L. Tosatti [O]).

Oca selvatica *Anser anser* x oca canadese *Branta canadensis*

Osservati ripetutamente fino a un massimo di 5 ind. nel comune di Argenta (FE) (A. De Faveri).

Fenicottero del Cile *Phoenicopterus chilensis* x Fenicottero americano *Phoenicopterus ruber*

Osservazioni ripetute di 1 individuo tra le saline e valli di Comacchio e Boscoforte, Argenta (FE) (censimenti mensili AsOER). L'individuo, sprovvisto di alcun tipo di marcaggio, presenta caratteri intermedi tra le due specie, per questo è stato identificato come ibrido.

INDIVIDUI DETERMINATI A LIVELLO GENERICO

Pernice di mare indeterminata *Glareola* sp.

1 ind. fotografato in volo sul Po presso Piacenza da S. Corbellini in data 07-10. L'attribuzione specifica non risulta possibile dalla documentazione in raccolta. Si riporta il dato in quanto le segnalazioni per l'interno sono occasionali.

Ficedula sp.

>1 ind. Il Passone, Villa Minozzo-Comuni del Ventasso (RE), 09-07 (M. Campani). Balia nera/balia dal collare, il dato viene riportato, nonostante i dubbi sull'identificazione, in quanto il periodo e la località di osservazioni sono inusuali.

ADDENDA 2022

Moriglione *Aythya ferina*

1 f. con 6 pulli nati da pochi giorni presso un fossato nel comune di Medicina (BO), 29-06-2022 (A. De Faveri).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

1 ind. (1cy) Castelvetro piacentino (PC), 31-07-2022 (E. Crepet).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. Castelvetro piacentino (PC), 01-03-2022 (E. Crepet).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Nidificazione probabile: Osservata una coppia trasportare materiale per la costruzione del nido presso Caorso (PC), in una zona golenale del Fiume Po, il 29-04-2022 (A. Battaglia).

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano:

Simona Adorni, Andrea Ambrogio, Alberto Amaretti, Fabio Anceschi, Roberto Annoni, Luca Artoni, Giovanni Arveda, Giacomo Assandri, Eros Ballardini, Simone Balbo, Germano Balestrieri, Vittorio Barbieri, Guido Baroni, Massimo Bartolucci, Emanuela Battistini, Gaia Bazzi, Angela Bellini, Alberto Belosi, Riccardo Beltrami, Romano Benassi, Massimo Benazzo, Vittorio Benini, Alessandro Berlusconi, Sandro Bertè, Federico Bianco, Angelo Bolsi, Lucio Bonato, Dante Bonazzi, Luca Bonomelli, Fabrizio Borghesi, Ermes Borghi, Paolo Borsari, Antonio Bossi, Stefano Brigidi, Massimo Campani, Massimo Caprara, Matteo Cargasacchi, Renato Carini, Maurizio Casadei, Rossella Casari, Andrea Castellini, Maurizio Castellucci, Enrico Castellucci, Maurizio Cazzanti, Carlo Chiari, Carlo Ciani, Mirco Cigarini, Luigi Cobiانchi, Cellina Codaglio, Luciano Conventi, Stefano Corradi, Roberta Corsi, Marco Cortemiglia, Massimiliano Costa, Alberto Costetti, Margherita Coviello, Emanuele Crepet, Lorenzo Dalla Libera, Claudio Danesi,

Alma de Angelis, Sabino de Feudis, Gaia De Luca, Federico De Marco, Francesco de Palma, Federico de Pascalis, Davide de Pasquale, Stefano Donello, Flavio Felici, Mauro Fenati, Sara Ferrari, Andreina Ferrari, Stefano Festi, Domenico Festa, Rosy Folloni, Marco Fontanesi, Giovanni Fontanesi, Gianni Galeotti, Fabio Gardosi, Raffaele Gemmato, Giuliano Gerra, Patrizio Gigli, Carlo Maria Giorgi, Nunzio Grattini, Agnieszka Greiner, Luciano Grisendi, Marco Gustin, Wendy Humphreys, Rita Lamattina, Nicola Larroux, Pietro Leanza, Giorgio Leoni, Lino Lipparini, Dayron Lopez, Amos Loschi, Fabio Lovisetto, Patrizia Madelli, Lorenzo Maffezzoli, Roberto Maistri, Stefano Manfredini, Edoardo Marchesini, Massimo Mari, Mirco Maselli, Lucia Mattarozzi, Pietro Melandri, Michele Mendi, Gabriella Meo, Erika Mero, Gabrielle Minelli, Cristian Montevecchi, Michelangelo Morganti, Alessandro Mucciolo, Moreno Nalin, Giuseppe Nassi, Patrizia Nava, Giorgio Nini, Maddalena Nironi, Ernesto Occhiato, Pierangelo Orlandelli, Andrea Orlandi, Fabio Padovani, Giorgio Padovani, Daniele Panaretti, Paolo Panni, Maurizio Parenti, Paolo Pasini, Angelo Pasqua, Menotti Passarella, Raffaella Pavan, Fabio Piccolo, Federico Pino, Sergio Piccolo, Carlo Poiani, Luca Puglisi, Gabriele Raiser, Maurizio Ravasini, Bassano Riboni, Antonio Rinaldi, Simone Rizzi, Daniele Ronconi, Giuseppe Rossi, Paolo Rovatti, Alfio Sala, Franco Salvini, Marco Sampaoli, Guido Sardella, Raffaella Scaccaglia, Diana Sciandra, Enrico Selmi, Samuele Sereni, Fabio Simonazzi, Stefano Sirotti, Diana Sitti, Giuseppe Speranza, Francesca Sofri, Alberto Sorace, Renzo Storer, Andrea Tarozzi, Massimo Tassinari, Diego Tedesco, Lorenzo Tosatti, Danilo Trombin, Gianluca Ubaldi, Paolo Vacilotto, Giuseppe Vandelli, Piero Venturi, Wolfgang Wellinghausen-Striebel, Andrea Zanichelli, Mariapia Zini, Alessandro Zoboli, Paolo Zucca, Federico Zucchetti, Sara Zueger, Giorgio Zuffi. Si desidera ringraziare particolarmente l'associazione Becot-Group Aigle Royal Drome-Vautour en Baronnies, Christian Itty, Andrew Hargreaves e Nicolas Renous, i volontari del GLC Reggio Emilia-Carpi, i volontari del GLC Parma, i volontari del Progetto Garzaie ed i volontari dei censimenti mensili Cisniar/SOM.

BIBLIOGRAFIA

- AsOER, 2023. Un anno terribile per la riproduzione di specie acquatiche e non solo. Notiziario AsOER. Picus 95-96: 60-61.
- BACCETTI N., FRACASSO N. & C.O.I., 2021. CISO-COI Checklist of Italian birds - 2020. Avocetta 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en.
- BACCETTI N., FRACASSO G. & GOTTI C., 2014. La lista CISO COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21.
- BATTAGLIA A., 2020. Uccelli del Piacentino. Edizioni L.I.R.
- CECCARELLI P.P., AGOSTINI N., MILANDRI M. & BONORA M., 2008. Il Picchio nero *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Quad. Studi Nat. Romagna, 27: 143-154.
- CREPET E. Little Bunting *Emberiza pusilla* (N. 28). In Bazzi G. (ed.), 2023. BIRD NEWS. Avocetta 47 (2): 3. <https://doi.org/10.30456/AVO.2023108>
- DEL HOYO J. & COLLAR N. J., 2014, 2016. HBW and BirdLife international illustrated checklist of the birds of the world. Lynx Edicions, Barcelona.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2003. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna. Anno 2002. Picus. 29: 9-18.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2004. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna, anno 2003: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. Picus. 30: 97-109.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2006. Resoconto ornitologico dell'Emilia-Romagna Anno 2004: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. Picus. 32: 9-22.
- GIANNELLA C., MINELLI F. & RABACCHI R., 1996. Resoconto ornitologico modenese anni 1989-1995. Picus. 22: 115-130.
- LOSCHI A. & PERUZ A. African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* (N. 8). In Bazzi G. (ed.), 2023. BIRD NEWS. Avocetta 47 (2): 9. <https://doi.org/10.30456/AVO.2023108>
- NICOLI A., 2023a. Segnalazioni dall'Italia. Quaderni di Birdwatching 41: 78-81.
- NICOLI A., 2023b. Segnalazioni dall'Italia. Quaderni di Birdwatching 42: 52-54.
- NICOLI A., 2024. Segnalazioni dall'Italia. Quaderni di Birdwatching 43: 66-69.
- PAVESI A., FIORINI C., RAVAGNANI A., FARIOLI A., BACCI M., BAGNI L., BATTAGLIA A., CECCARELLI P. P., DE FAVERI A., GIANNELLA C., ROSCELLI C. & TINARELLI R., 2023a. Resoconto ornitologico per la Regione Emilia-Romagna - Anno 2022. Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, 11: 47-62.
- PAVESI A., FIORINI C., RAVAGNANI A., FARIOLI A., BAGNI L., BATTAGLIA A., BORGHESI F., CECCARELLI P. P., DE FAVERI A., GIANNELLA C., ROSCELLI F. & TINARELLI R., 2023b. Checklist degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al 31 dicembre 2021, con note e commenti delle specie di maggiore interesse a livello regionale. 70 pp. <https://www.asoer.org/>.
- HBW e BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2022. Handbook of the birds of the world and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Ver. 7. <http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy>

SITOGRAFIA

- <https://www.ebnitalia.it/>
- <https://www.facebook.com/groups/273472081878933> Gruppo Facebook “Emilia Romagna birding”.
- <https://www.inaturalist.org/observations/163154954>
- <https://www.oglioponews.it/2023/11/24/fiume-po-avvistato-lo-zigolo-delle-nevi-migratore-del-nord/>
- <https://www.ornitho.it/index.php> (AA. VV., ultima consultazione in data 20-06-2024)
- https://www.parmavisiteguidate.it/parmabw/bw/parmabw_confr.pdf
- <https://www.youtube.com/shorts/oO-MI24wI9w>