

Resoconto ornitologico per la Regione Emilia-Romagna - Anno 2024

ALESSANDRO PAVESI, CLAUDIO FIORINI, ANDREA RAVAGNANI, ALESSIO FARIOLI, MATTIA BACCI, LUCA BAGNI, ANGELO BATTAGLIA, ADRIANO DE FAVERI, CARLO GIANNELLA, CARLO MARIA GIORGI, DAYRON LOPEZ, FRANCO ROSCELLI E ROBERTO TINARELLI

AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV) Via Boccaccio 23, Imola (BO)
Corresponding author: ale.pavesi18@gmail.com

RIASSUNTO

Vengono riportate le osservazioni ornitologiche di maggiore interesse per la Regione Emilia-Romagna, raccolte durante l'anno 2024. Tra gli altri si riportano le osservazioni di specie accidentali a livello regionale (Oca colombaccio *Branta bernicla*, Totano zampegialle minore *Tringa flavipes*, Strolaga maggiore *Gavia immer*, Berta grigia *Ardenna grisea*, Nibbio bianco *Elanus caeruleus*, Aquila imperiale *Aquila heliaca* e Lui di Hume *Phylloscopus humei*) e informazioni sulla nidificazione di alcune specie localizzate o con importanti variazioni di areale e consistenza della popolazione.

Parole chiave: Citizen science, Resoconto ornitologico, Emilia-Romagna, Avifauna.

ABSTRACT

Ornithological report for the Emilia-Romagna Region - Year 2024

The most interesting ornithological observations for the Emilia-Romagna Region, collected during the year 2024, are reported. Among others, we report observations of regional vagrants (Brant Goose *Branta bernicla*, Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*, Common Loon *Gavia immer*, Sooty Shearwater *Ardenna grisea*, Black-winged Kite *Elanus caeruleus*, and Hume's Leaf-warbler *Phylloscopus humei*) and information on the nesting of some localized species or with important variations in range and population size.

Key words: Citizen Science, Ornithological Report, Emilia-Romagna, Avifauna.

INTRODUZIONE

Questo resoconto si propone di raccogliere le osservazioni ornitologiche salienti per la regione Emilia-Romagna durante l'anno 2024, in particolare riguardanti specie a comparsa accidentale o nidificanti irregolari sul territorio, così come dati interessanti per la fenologia delle specie. Per quanto non derivante da ricerche di campo mirate ed esaustive, la raccolta in un singola pubblicazione di tutte le osservazioni di interesse mira ad evitare la dispersione dei dati tra le numerose piattaforme di citizen science disponibili, rendendole inoltre maggiormente accessibili anche in futuro. A livello regionale, resoconti ornitologici hanno preso in considerazione le osservazioni all'inizio degli anni 2000 (GIANNELLA & TINARELLI, 2003, 2004, 2006) e più recentemente nel 2022 e nel 2023 (PAVESI *et al.*, 2023a; PAVESI *et al.*, 2024). A livello provinciale raccolte di dati analoghe sono state redatte per il Modenese per il periodo 1985-1995 (RABACCHI, 1989; GIANNELLA *et al.*, 1996) e per il Parmense nel periodo 2004-2025 (<https://www.parmavisiteguidate.it/parmbaw/>).

MATERIALI E METODI

Per la compilazione del resoconto sono stati consultati i dati raccolti durante le attività di monitoraggio svolte da AsOER - Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV, come censimenti mensili degli uccelli acquatici svolti nel comprensorio delle Valli di Comacchio e censimenti degli uccelli acquatici svernanti (IWC), dati inediti degli stessi associati e dalla SOM - Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" e Cisniar - Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, associazioni che svolgono attività di ricerca e divulgazione. Un numero rilevante di osservazioni è stato ottenuto grazie alla consultazione delle principali piattaforme di raccolta dati di citizen science come Ornitho.it, iNaturalist.org, eBird.org; piattaforme social come facebook.com o provenienti dai canali EBN Italia (<https://www.ebnitalia.it/>). Non mancano inoltre comunicazioni di osservazioni personali pervenute ai redattori.

La nomenclatura è in accordo con la recente lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani (BACCETTI *et al.*, 2021) mentre l'ordine tassonomico segue AviList, lista globale unificata recentemente pubblicata (AVILIST CORE TEAM, 2025).

Sono state prese in considerazione le seguenti categorie per le quali il grado di interesse di ogni singolo dato, considerata l'eterogeneità del territorio regionale, varia in base all'area geografica in cui è stato raccolto:

- Specie nidificanti irregolari e nidificanti regolari in aree geografiche inusuali
- Specie svernanti irregolari o svernanti regolari in aree geografiche inusuali e/o con numeri inusuali.
- Specie nidificanti e svernanti regolari quando vi sono dati aggiornati che descrivono variazioni significative di consistenza e/o distribuzione.
- Specie migratrici irregolari o con numeri inusuali, accidentali, estivanti.
- Specie esotiche importate o introdotte.
- Individui con piumaggi aberranti, ibridi, altro che non rientrano nelle categorie precedenti.

Le segnalazioni sono state riportate per esteso (n. individui, località, comune, provincia, data, osservatore/i e/o fonte/i). Nel caso di osservazioni ripetute, generalmente sono indicati solo i segnalatori o i primi osservatori. Se il dato proviene da piattaforme di raccolta dati, queste sono state riportate, dopo il/i nome/i del/degli osservatore/i in forma contratta e tra parentesi quadre come segue: Ornitho.it [O], EBN Italia [E], Facebook [F], eBird [e], inaturalist.org [N]. Per quanto riguarda le specie accidentali (A30), a livello regionale, il dettaglio dell'osservazione è seguito da un asterisco (*) se la segnalazione è documentata in modo incontrovertibile.

Per segnalazioni riferite alle località dell' "interno" si intendono quelle effettuate nelle province di Bologna, Modena, Reggio nell'Emilia, Parma e Piacenza, salvo diversamente specificato. Il periodo preso in considerazione per le segnalazioni invernali comprende i mesi di dicembre e gennaio.

Il numero di individui può essere separato da un trattino "-" ad indicare il numero minimo e massimo di individui osservati nel range temporale indicato; analogamente le date di prima e ultima osservazione possono essere separate da "/".

Sono altresì stati abbreviati alcuni termini qui di seguito riportati: coppia/e (cp.), individuo/i (ind.), maschio (m.), femmina (f.), giovane/i (juv.), adulto/i (ad.), immaturo/i (imm.), calendar year (cy), stima (-), massimo (max.), International Waterbird Census (IWC), Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" (SOM) e Cisniar - Centro Italiano Studi Nidi Artificiali (Cisniar).

RISULTATI

Elenco delle osservazioni:

Cigno nero *Cygnus atratus*

1 ind. Comacchio (FE), il 10-01 (M. Passarella [O]) e il 13-05 (G. Rocca); 1 ind. osservato ripetutamente a Ostellato (FE), febbraio (M. Passarella *et al.* [O]); 1 ind. osservato ripetutamente ad Argenta (FE) il 22/23-02 e il 16-06 (M. Tassinari, R. Falzoni, A. Amaretti [O]); 1 ind. Valle Furlana, Ravenna (RA) il 16-08 e il 22-11 (censimenti mensili AsOER).

Oca colombaccio *Branta bernicla*

1 ind. Bonifica Standiana (RA), il 12/23-01 (censimenti IWC *et al.* [E]; Nicoli, 2024a)*

Oca del Canada *Branta canadensis*

1 ind. Reggio nell'Emilia, il 28-02 (M. Gigante [O]); 1 ind. Borgonovo Val Tidone (PC), il 21-04 (S. Corbellini [O]); 3-4 ind. osservati ripetutamente nel ferrarese tra Bando e Bonifica del Mantello (R. Tinarelli, M. Bacci *et al.*).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. di origine presumibilmente aufuga presso la ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 17/28-05 (A. Ravagnani). 1 ind. con collare bianco A87 relativo a un progetto U.K., Comacchio (FE), il 17-06 (P. Melandri [O]); 1 ind. Argenta (FE), il 27/28-12 (L. Bonanno e A. Amaretti [O]).

Oca selvatica *Anser anser*

Riproduzioni nelle province più occidentali (RE, PR, PC): nel parmense 4 cp. con juv. presso una AVF nel comune di Mezzani (F. Lovisetto [O]), 1 cp. con 2 juv. presso l'Oasi LIPU di Torrile (B. Riboni [O]) e 1 ind. in cova presso Chiesuole, Collecchio (R. Carini [O]).

Concentrazioni massime per l'interno: 1947 ind. l'11-08 e 1665 ind. il 15-11 nella Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

4 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), il 04/11-01 (M. Castellucci, E. Castellucci [E]; censimenti IWC AsOER); fino a un max. di 7 ind. il 23-12 nella Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE) e 1 ind. presso Valle Zavelea (FE) (E. Castellucci [O][E]). 1-2 ind., probabilmente facenti parte del gruppo di 7 sopracitato, sono stati osservati ripetutamente fino a fine dicembre tra i comuni di Argenta e Portomaggiore (FE).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Concentrazioni rilevanti al di fuori della provincia di Ferrara, che ospita regolarmente un importante contingente di svernanti: ~ 1500 ind. Molinella (BO), il 16-01 (R. Corsi).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

Presso il Bosco della Mesola (FE), 2 ind. il 09-03 e 1 ind. il 05-05 (D. Trombin [O]); 1 m. e 1 f. Mesola (FE), il 27-04 [N].

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Nidificazioni: 1 cp. con 8 juv. il 18-02, Parco Ducale di Parma, con gli 8 juv. predati e seconda covata con 6 juv. il 28-05 (F. Roscelli, A. Ferrari [O]); 1 cp. con 2 juv., Villa Corbelli (RE), il 10-06 (M. Fontanesi [O]); 1 cp. con 3 juv. presso Castellarano (RE), il 19-06 (G. Fontanesi [O]); 2 ad. con almeno 5 juv. (di cui uno leucistico) presso l'Oasi La Rizza, Bentivoglio (BO), il 01-09 (E. Nardelli [O]). Sono segnalate inoltre nidificazioni alle Casse d'Espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE) (G. Fontanesi [O]).

Concentrazioni rilevanti: Presso le Casse d'Espansione del Secchia, Campogalliano-Rubiera (MO-RE) osservati gruppi consistenti con un picco di 90 ind. il 16-01 e l'01-02 (G. Fontanesi [O]; censimenti IWC).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Nidificazioni accertate per l'interno: 1 f. con 7 juv., Le Mele-

ghine, Finale Emilia (MO), il 28-05 (R. Gemmato [F]); 1 cp. con 1 juv. di pochi giorni, Oasi LIPU di Torrile (PR), 01-06 (V. Alfano, A. Pavesi). In provincia di Bologna conteggiati 43 juv. nei bacini dello zuccherificio di Minerbio (M. Bacci).

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 100 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 13-02 (G. Leoni [O]); 198 ind. il 12-02 e nuovamente 197 ind. il 16-03 nella Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: a Goro (FE), 3953 ind. l'01-02 (censimenti mensili AsOER).

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. di origine aufuga e già osservato precedentemente è stato osservato da gennaio a dicembre presso il Laghetto del Parco Ducale di Parma (F. Roscelli); presso le Casse d'Espansione del Secchia sono stati osservati 3 ind. l'01-02 e 1 ind. il 18-01 (G. Fontanesi [O]). 1 ind. Villa Corbelli (RE), 30-03 (G. Fontanesi [O]). Nel modenese osservati diversi individui di origine aufuga in diverse località planiziali come ZSC-ZPS Manzolino Tivoli (MO-BO), Riserva delle Casse di espansione del fiume Secchia (MO-RE), Carpi, Bassa Modenese, Nonantola (A. Ravagnani). In provincia di Ferrara, 1 ind. è stato osservato ripetutamente tra la fine di febbraio e la fine di marzo nei comuni di Ostellato ed Argenta (S. Rambelli *et al.* [E][O]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

1 ind. litorale San Mauro Mare (FC), il 20-01 (R. Corsi [O]); 1 f. Valli di Comacchio (FE), il 27/30-12 (M. Castellucci *et al.* [O]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

1 ind. Casalborgsetti (RA), il 09-01 (censimenti IWC); 6 ind. Goro (FE), il 13-12 (censimenti mensili AsOER). Nel tratto di mare antistante Lido di Spina e Lido degli Estensi, Comacchio (FE), sono stati osservati ripetutamente alcuni ind. dal 2 al 7 febbraio, con un max. di 11 ind. il 02-02 (M. Passarella *et al.* [O]).

Orco marino *Melanitta fusca*

Presso Lido di Spina, Comacchio (FE), 2 ind. il 01-01 (P. Nava, E. Castellucci, M. Castellucci [O]), 5 ind. il 13-01 (M. Fenati [O]), 1 ind. il 06-02 (F. Felici [O]) e 1 ind. il 21-12 (S. Adorni *et al.* [O]). Inoltre 3 ind. il 10-01 e 7 ind. il 19-03 presso Goro (FE) (censimenti IWC, censimenti mensili AsOER); 2 ind. Foce Bevano (RA), il 12/23-01 (censimenti IWC; [O]).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Segnalazioni al di fuori delle tipiche località di svernamento: 2 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 04-02 (R. Fantini [F]); 1 ind. Riserva delle Casse di espansione del fiume Secchia (MO-RE), il 03-03 (G. Fontanesi e M. Campani [F]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Segnalazioni nell'interno: 1-2 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), fra il 09-01 e il 23-01 (G. Leoni [O] e censimenti IWC).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

1 ind. Val Campotto, Argenta (FE), il 23-12 (M. Fenati [O]).

Fistione turco *Netta rufina*

Nidificazione: 1 f. con 3 juv. Laghi di Medesano (PR), il 06-09 (F. Roscelli).

Segnalazioni nell'interno: 2 ind. Bassa Modenese, il 16-03 (censimenti mensili Cisniar/SOM), probabilmente gli stessi ricontattati presso le Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO) il 06-04 (A. Pasqua [O]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Nidificazione: 4 juv. Medicina (BO), il 15-06 (M. Caprara)

Concentrazioni rilevanti: in Cassa Campotto, Argenta (FE), 18 ind. il 19-03, 30 ind. il 26-04; 38 ind. il 24-05; 27 ind. il 26-06; 112 ind. il 24-07; 34 ind. il 23-08 (censimenti mensili AsOER); nel Bassarone, Valli di Argenta (FE), 64 ind. il 24-07; 65 ind. il 23-08 (censimenti mensili AsOER).

Moriglione *Aythya ferina*

Concentrazioni rilevanti: in Cassa Campotto, Argenta (FE), 1592 ind. il 23-02; 1145 ind. il 24-07 (censimenti mensili AsOER), nella cassa del Bassarone, Argenta (FE), 1062 ind. il 23-08 (censimenti mensili AsOER).

Nidificazione: 1 f. con 3 juv., Le Meleghine, Finale Emilia (MO), il 18-05 (L. Tosatti [F]); 1 f. con 6 juv., Oasi LIPU di Torrile (PR), il 20-06 (F. Roscelli). 3 f., rispettivamente con 1, 1 e 3 juv. presso ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO) (A. Ravagnani; [N]); 1 f. con 2 juv. presso l'A.R.E. Il Torrazzuolo, Nonantola (MO) (E. Selmi); 5 juv. Azienda Marzara, Medicina (BO), il 13-06 (A. De Faveri); 14 juv. bacini dello zuccherificio di Minerbio (BO), il 19-06 (M. Bacci); 5 juv. bacini dello zuccherificio di Crevalcore (BO), il 27-05 (L. Golinelli); 1 cp. con 5 juv. in Pialassa della Baiona (RA), il 04-07 (F. Borghesi [O]).

Moretta grigia *Aythya marila*

1 ind. Valle Bertuzzi, Comacchio (FE), il 10-01 (A. Ravagnani); 1 ind. Cave San Bartolo (RA), il 12-01 (censimenti IWC); fino a 9 ind. presso il Lago delle Nazioni, Comacchio (FE), nella seconda metà di dicembre (F. Lovisetto *et al.* [O]).

Mestolone *Spatula clypeata*

Nidificazioni per l'interno: 1 f. con 5 juv., Oasi LIPU Torrile (PR), il 29-05 (A. Zanichelli).

Concentrazione rilevante: in Val Campotto, Argenta (FE), 1592 ind. il 23-02 (censimenti mensili AsOER).

Concentrazioni rilevanti per l'interno (superiori a 150 ind.): 399 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 16-01 (A. Ravagnani); 539 ind. Bassa Modenese, il 16-03 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Canapiglia *Mareca strepera*

Nidificazioni al di fuori delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna dove la specie nidifica regolarmente: presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR) 1 f. con 1 juv. il 02-06 (S. Balbo [O]) e 1 f. con 3 juv. il 13-06 (F. Roscelli); presso i Laghi di Medesano (PR), osservate 2 nidiate rispettivamente composte da 5 e 7 juv. il 06-06 (F. Roscelli).

Concentrazioni rilevanti: in Cassa Campotto, Argenta (FE), 1179 ind. il 23-07 (censimenti mensili AsOER).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Concentrazioni massime per l'interno: 3892 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), 16-01 (censimenti IWC); ~ 4000 ind. "La Francesca", Carpi (MO), l'08-09 (A. Orlandi [O]); 4621 ind. Bassa Modenese, il 12-09 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Alzavola *Anas crecca*

Concentrazioni massime a livello locale: 788 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 16-01 (censimenti IWC); 1492 ind. Bassa Modenese, il 12-02 (censimenti mensili Cisniar/SOM). Nidificazione: 1 f. con 8 juv. in Valle La Scorticata (RA), il 16-08 (A. Pavesi e D. Lopez; censimenti mensili AsOER).

Fenicottero minore *Phoeniconaias minor*

2 ind. segnalati ripetutamente durante tutto l'anno nelle Valli di Comacchio (FE) (censimenti AsOER).

Fenicottero *Phoenicopterus roseus*

Nidificazione: un conteggio effettuato sulle ortofoto riprese ad inizio agosto ha portato ad un totale di 8376 pulli nell'unica colonia in cui si riproduce la specie, al centro delle Valli di Comacchio (Volponi, 2024).

Segnalazioni in località inusuali: 6 ind. Castelvetro Piacentino (PC), il 16-05 (laprovinciacr.it); 2 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 06 e l'11-08 (D. Festa e P. Rovatti [O]) e nuovamente dal 17 al 23-09 (P. Rovatti); 22 ind. presso Villa Seta, Cadelbosco di Sopra (RE), il 10-11 (L. Ferrari [F]). Concentrazioni rilevanti per il Bolognese e per il Modenese, dove la specie viene ormai osservata regolarmente: 87 ind. "La Francesca", Carpi (MO), il 14-01 (A. Orlandi [O]); 90 ind. San Matteo della Decima, San Giovanni in Persiceto (BO), il 18-09 (A. Ravagnani); 94 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola, il 21-10 (L. Tosatti).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE) 10918 ind. il 19-04, 10407 ind. il 15-05, 14486 ind. il 07-06 e 16034 il 19-07, 11123 ind. il 16-08 (censimenti mensili AsOER).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. Foce Bevano (RA), il 12/22-01 (censimenti IWC e M. Castellucci [O]); 1 ind. Goro, il 13-12 (A. Farioli).

Svasso collorosso *Podiceps grisegena*

Presso Lido di Spina, Comacchio (FE) osservato ripetutamente 1 ind. fino al 10-01, presente dal 07-10-23 (Pavesi *et al.*, 2024; P. Nava *et al.* [O]); 1 ind., possibilmente lo stesso, viene qui osservato ripetutamente dal 12-02 al 15-03, quindi il 26-04, il 27/30-09, il 28-10, il 22-11 e di nuovo ripetutamente dal 02 al 11 dicembre (censimenti mensili AsOER); 1 ind. Porto Corsini (RA), il 18/26-04 (F. Fanesi *et al.* [O]).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Segnalazioni per l'interno: 1 ind. Chiesuole, Collecchio (PR), il 16/25-01 (R. Carini [O]); 1 ind. Laghi Luceria, San Polo d'Enza-Canossa (RE), il 17-05 (L. Artoni [O]); 1 ind. Laghi di Medesano (PR), il 14-09 (D. Ronconi [O]); fino a 9 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 05/06-10 (A. Zanichelli); 2 ind. "La Francesca", Carpi (MO), il 12-10 (A. Orlandi [O]); 2 ind. Medesano (PR), il 31-10 (D. Ronconi [O]); 1-3 ind. osservati

ripetutamente presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR) dal 27-11 al 08-12 (D. Festa e P. Rovatti [O]).

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

1 ind. San Giovanni, Ostellato (FE), il 09-05 (A. Farioli).

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Concentrazione rilevante: ~ 200 ind. "Le Melegghine", il 05-09 (R. Gemmato [O]).

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Concentrazione rilevante: ~ 500 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 02-01 (G. Leoni [O]).

Colombella *Columba oenas*

Concentrazioni rilevanti (superiori a 100 ind.): 125 ind. Bonifica del Mezzano Nord, Ostellato (FE), il 09-01 (R. Corsi [O]); 230 ind. Leona, Jolanda di Savoia (FE), il 10-01 (R. Tinarelli); 300 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), il 10-01 (R. Gemmato [O]); fino a 250 ind. Bonifica del Mezzano Nord, Ostellato (FE), il 23-11 (M. Nalin [O]); 100 ind. Valle Pega, Comacchio (FE), il 23-11 (P. Zerri e P. Venturi [O]); 220 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), il 14-12 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 650 ind. Argenta (FE), il 12-12 (C. Fiorini); 200 ind. Bonifica del Mezzano Sud, Argenta (FE), il 30-12 (L. Tosatti [O]).

Gru *Grus grus*

Segnalazioni estive: 1 ind., probabilmente lo stesso inabile al volo contattato negli anni precedenti (Pavesi *et al.*, 2024), presso Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 04-07 e il 29-08 (A. Berlusconi e A. Pasqua [O]).

Svernamento: a livello regionale, nel mese di gennaio, sono stati censiti almeno 6400 ind., prevalentemente concentrati nel Ferrarese in Valle Zavelea e Valle Bertuzzi e nel Bolognese nell'AVF Galla Fiorentine di Molinella (AsOER).

Voltolino *Porzana porzana*

Segnalazioni invernali: 1 ind. Valli di Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), il 16-01 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Folaga *Fulica atra*

Concentrazioni massime per l'interno: 409 ind. Bassa Modenese, il 12-02 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Occhione *Burhinus oediacnemus*

Concentrazioni in periodo invernale: >49 ind. Monticelli Terme, Montechiarugolo (PR) e >39 ind. Basilicanova, Montechiarugolo (PR), il 11-01 (M. Salvarani, M. Zanata [O]); 8 ind. Mezzani (PR), il 21-01 (F. Lovisetto [O]); fino a 40 ind. nella seconda metà di dicembre presso Boscone Cusani, Rottofreno (PC) (S. Corbellini [O]); 33 ind. Formigine (MO), il 31-12 (S. Donello). Segnalazione in località inusuale: 1 ind. Rimini Miramare, il 06-10 (C. Montevicchi [O]).

Avocetta *Recurvirostra avocetta*

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: a Goro (FE), 1010 ind. l'01-02 (censimenti mensili AsOER).

Concentrazioni massime per l'interno: 218 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), l'01-01 (A. Ravagnani); 135 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 22-02 (G. Balestrieri [O]); 177 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 16-01 (censimenti IWC); 162 ind. Bassa Modenese, il 16-03 (censi-

menti mensili Cisniar/SOM); 120 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 17-02 (G. Zuffi [O]).

Nidificazione: In Provincia di Parma, presso l'Oasi LIPU di Torrile si sono insediate 15 coppie ma nessun involo è stato registrato a causa di abbondanti piogge e predazioni (P. Rovatti).

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 243 ind. il 06-04 e 202 ind. il 16-06 nel comprensorio delle Valli della Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Segnalazioni tardive e invernali: 1 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 16-01 (A. Ravagnani *et al.* [O]); 1 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 28-11 (S. Contini); 2 ind. "La Francesa", Carpi (MO), il 21-12 (G. Zuffi [O]). Nel Ferrarese viene confermato lo svernamento di 10-15 ind. sia in gennaio che in dicembre (censimenti mensili AsOER).

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Nel tratto di fiume Po compreso tra i comuni di Sissa e Rocca Bianca (PR) osservato 1 ind. il 4-05, 1 ind. il 25-04, 1 ind. il 16-06, 1 ind. il 06-07 e 1 ind. il 24-07 (S. Balbo [O]).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

Segnalazioni per l'interno (BO, MO, PC, PR, RE): 2 ind. l'11-08. 1 ind. il 16-03 e il 15-11 Bassa Modenese (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: a Goro (FE), 589 ind. il 19-03, 516 ind. il 17-05 (censimenti mensili AsOER).

Piviere tortolino *Eudromias morinellus*

1 ind. Saline di Cervia (RA), il 06-05 (E. Castellucci [O][E]); 7 ind. Il Passone, Villa Minozzo (RE), l'01-09 (A. Ravagnani); 1 ind. Pian Cavallaro, Riolunato (MO), il 07-09 (C. M. Giorgi); 1 ind. Macerone (FC), l'01-10 (E. Castellucci [O]).

Corriere piccolo *Thinornis dubius*

Segnalazioni invernali: 1 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 16-01 (censimenti IWC)

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Concentrazioni massime per l'interno: 1575 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli, l'01-01 (A. Ravagnani); 2781 ind. Bassa Modenese, il 12-02 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Segnalazioni per l'interno (MO, PC, PR, RE): 1 ind. il 20-04 e 2 ind. il 25-05 presso il fiume Po nel comune di Sissa (PR) (S. Balbo [O]); 1 ind. Stradone, Rottofreno (PC), il 15-08 (S. Corbellini [O]); 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO) il 22-08 (R. Gemmato [O]); 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 29-08 e il 09-09 (A. Pasqua [O]).

Concentrazione rilevante a livello regionale: 51 ind. Vene di Bellocchio, Comacchio/Ravenna (FE/RA), il 16-08 (censimenti mensili AsOER).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 116 ind. Bassa Modenese, il 16-03 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Segnalazioni per l'interno: 1 ind. Valle Buschetti, Baricella (BO), 23-04 (M. Bacci); 1 ind. osservato ripetutamente presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR), dal 26-09 al 06-10 (D. Festa *et al.* [O]).

Segnalazione invernale: 1 ind. il 10-01 e 2 ind. il 13-12 presso Goro (FE) (censimenti IWC, censimenti mensili AsOER).

Concentrazione rilevante a livello regionale: 22 ind. Goro (FE), il 11-10 (censimenti mensili AsOER).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

3 ind. Salina di Comacchio (FE), 06-09 (censimenti mensili AsOER).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

1 ind. presso Carpi, Valle di Gruppo (MO), il 18-04 (G. Galeotti [F]); 1 ind. Villanova (FC), il 20/22-04 (M. Bacci e A. Amaretti [O]); 1 ind. chiari di Cesenatico (FC), il 01-05 (S. Brigidi [O]); 16 ind. nel comprensorio delle Valli di Comacchio (FE), il 19-07 (censimenti mensili AsOER).

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Segnalazioni tardive: 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), il 18-11 (R. Gemmato [O]) e il medesimo giorno 1 ind. transitato in volo presso le Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO) (G. Rossi [O]).

Totano zampeggiale minore *Tringa flavipes*

1 ind. Comacchio (FE), il 10-04 (M. Passarella [O]); L. Lipparini in Nicoli, 2024a)*; 1 ind., probabilmente lo stesso osservato a Comacchio, è stato osservato presso le Vene di Bellocchio (RA-FE), il 19-04 (A. Ravagnani; censimenti mensili AsOER)*; 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 14/17-05 (G. Gerra *et al.* [O][E]; Nicoli, 2024b)*. Si tratta rispettivamente della quinta e sesta segnalazione regionale nota (Pavesi *et al.*, 2023a, 2023b, 2024).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Concentrazioni rilevanti a livello regionale: 26 ind. Goro (FE), l'01-02 e 20 ind. nelle Vene di Bellocchio (RA-FE) il 06-09 (censimenti mensili AsOER).

Combattente *Calidris pugnax*

Segnalazioni invernali: 60 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 05-01 (L. Tosatti [O]); 2 ind. Busseto (PR), l'11-12 (A. Sala [O]).

Concentrazioni massime nell'interno: 300 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 24-03 (P. Nava [O]); 850 ind. Bassa Modenese, il 14-04 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Gambecchio frullino *Calidris falcinellus*

1 ind. ripristini dell'Azienda Gaiana, Comacchio (FE), 06 e 11 maggio (E. Castellucci, M. Tassinari, P. Melandri [O]); 2 ind. Goro (FE), il 11-05 (censimenti mensili AsOER); 1 ind. Vene di Bellocchio, Comacchio/Ravenna (FE/RA), il 19-07 (censimenti mensili AsOER).

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Segnalazione per l'interno (ad esclusione delle province di BO e MO, dove la specie viene segnalata con regolarità): 1 ind. Giarola, Collecchio (PR), il 18-08 (F. Roscelli).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Concentrazioni rilevanti: 3465 ind. l'01-02, 4121 ind. il 19-03 e 2221 ind. il 13-12 presso Goro (FE) (censimenti mensili AsOER); 1758 ind. il 10-03 e 1436 ind. il 18-03 presso le Saline di Cervia (RA) (E. Castellucci [E]).

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Segnalazione invernale per l'interno: 1 ind. Prati di San Clemente, Modena (MO), il 16-01 (censimenti IWC).

Pernice di mare *Glareola pratincola*

1 ind. Comacchio (FE), il 08/17-04 (M. Tassinari *et al.* [O]); 3-7 ind. Saline di Cervia (RA), il 29-04/09-05 (M. Passarella *et al.* [O][E]); 1 ind. Vene di Bellocchio, Comacchio/Ravenna (FE/RA), il 07-06 (censimenti mensili AsOER); 2 ind. Saline di Cervia (RA), il 02-08 (E. Castellucci [O][E]); 1 ind. "La Francesca", Carpi (MO), il 04/28-09 (P. Pasini *et al.*).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

Concentrazione rilevante: 12 ind. lungo il litorale tra Porto Garibaldi e Lido di Spina, Comacchio (FE), 19-07 (censimenti mensili AsOER).

Fratricello *Sternula albifrons*

Nidificazione per l'interno: 2-3 cp. nel tratto di Po tra foce Tidone e Foce Trebbia (PC) il 30-06 (A. Ambrogio).

La popolazione regionale nidificante, stimata in 275-430 cp. negli ultimi anni, è concentrata prevalentemente in 6-7 siti nelle province di Ferrara e Ravenna (AsOER).

Segnalazioni per l'interno: 1 ind. F. Po presso Colorno (PR), il 10-04 (S. Balbo [O]); 1 ind. A.R.E. Il Torrassuolo, Nonantola (MO), 08-05 (C. Chiossi); 2 ind. bacini zuccherificio di Minerbio (BO), il 21-05 (M. Bacci); 1 ind. Oasi LIPU Celestina, Campagnola Emilia (RE), l'01-06 (L. Bagni); 1 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 07-06 (G. Leoni, S. Donello); 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 04-07 (P. Rovatti e E. Battistini [O]); 1 ind. F. Po presso Sissa (PR), il 13-07 (S. Balbo [O]).

Concentrazione rilevante: 190 ind. Valle Smarlacca, Ravenna (RA), il 16-08 (censimenti mensili AsOER).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Segnalazioni per l'interno, ad esclusione della pianura orientale bolognese e del Ferrarese, dove la specie viene osservata con regolarità: 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 04-07 (L. Tosatti); 1 ind. F. Po presso Roccabianca (PR), il 06-07; 2 ind. F. Po presso Sissa (PR), il 03-08 (S. Balbo [O]); 1 ind. Castelvetro Piacentino (PC), l'01-09 (E. Crepet [O]); 1 ind. "La Francesca", Carpi (MO), il 06-09 e l'08-09 (A. Orlandi [O]).

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Nidificazioni: ~ 250 cp. insediate nel comune di Medicina (BO), giugno (C. Fiorini).

Segnalazioni nelle province più occidentali (PC, PR, RE): 1 ind. Prati di Samboseto, Busseto (PR), il 25-04 (P. Zucca [O]); 3 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 19-06 (P. Rovatti [O]); 1 ind. Guastalla (RE), il 15-07 (A. Pavesi); 3 ind. in volo sul Po presso Colorno (PR), il 21-07 (S. Balbo [O]); 2 ind. AFV Pianoni, Fabbrico, il 26-07 (L. Bagni e A. Pavesi); 3 ind. e 1 ind. rispettivamente il 27-07 e il 29-07 tra Casalpò (RE) e Sorbolo a Levante (RE) (S. Adorni [O]).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Si conferma lo svernamento sia in gennaio che in dicembre di una dozzina di ind. presso le Valli di Comacchio (FE) (censimenti mensili AsOER).

Nidificazione: nel 2024 nessuna nidificazione con successo è stata rilevata (R. Tinarelli).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Segnalazioni invernali: 2 ind. Comacchio (FE), il 09-01 (M. Bacci); 1 ind. in abito estivo presso Comacchio (FE), il 09-12 (M. Tassinari [O]).

Concentrazioni rilevanti: in Cassa Campotto, Argenta (FE), 567 ind. il 16-04; 359 ind. Valle Furlana, Ravenna (RA), il 16-08 (censimenti mensili AsOER).

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Concentrazione rilevante a livello regionale: 911 ind. il 23-08 presso Goro (FE) (censimenti mensili AsOER).

Sterna comune *Sterna hirundo*

Nidificazioni per le province più occidentali (PC, PR, RE) : in provincia di Piacenza ~ 30 cp. nidificanti nel tratto di Po tra foce Tidone e Foce Trebbia, 02-06 (A. Ambrogio). In Provincia di Parma, hanno nidificato 7 cp. presso l'Oasi LIPU di Torrile che hanno portato all'involto un totale di 7 giovani (P. Rovatti) e ~ 20 cp. a Chiesuole, Parco Regionale del Taro (PR) (R. Carini). In provincia di Reggio Emilia 1 cp. si è insediata nell'Oasi LIPU Celestina, Campagnola Emilia, ma entrambe le deposizioni sono state sommerse dalle piene (L. Bagni).

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

Concentrazioni rilevanti: ≥100 ind. Sacca di Goro (FE), il 26-05 (M. Passarella [O]); 54 ind. Campotto, Argenta (FE), il 11-06 (A. Ravagnani, censimenti mensili AsOER).

Segnalazione invernale: 1 ind. Penisola di Boscoforte, il 09-01 (A. Ravagnani).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Nidificazioni per l'interno: nel modenese 5 nidi presso Carpi, il 28-05 e 17 ind. fra cui 7 coppie con 2 pulli ciascuna, Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 28-05 (L. Tosatti [O]); 9 nidi occupati, Valle Buschetti, Baricella (BO), il 21-05 (M. Bacci); almeno 3 nidi con pulli Medicina (BO), il 02-06 (C. Fiorini). Concentrazioni massime per l'interno: dormitorio di ~ 6000 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 09-01 (G. Leoni [O]).

Gabbiano corallino *Ichthyophaga melanocephalus*

Segnalazioni per l'interno: 1 ind. in volo sul fiume Po piacentino il 09-01 (S. Corbellini [O]); 1-3 ind. 1cy osservati ripetutamente presso Castelvetro Piacentino (PC), tra il 12-08 e il 27-09 (E. Crepet [O]); 7 ind. Bevilacqua, Crevalcore (BO), il 23-10 (A. Ravagnani).

Gavina *Larus canus*

Segnalazioni per l'interno: 1-2 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), dal 01-01 al 13-02 (A. Ravagnani *et al.* [O]); 1 ind. Casse di espansione del Canale Burla, Parma (PR), l'01-02 (D. Ronconi [O]).

Larus canus heinei: 2 ind. Zadina (FC), il 21-01 (M. Passarella [O]); 1 ind. litorale Riccione (RN), il 30-12 (C. Montevocchi [O]).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

La specie viene ormai osservata regolarmente, seppur con pochi individui, in tutte le province.

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Nidificazioni per l'interno: in provincia di Piacenza nidifica regolarmente da parecchi anni sia su alcune isole del Po che sui tetti di palazzi e capannoni sia a Piacenza città che in alcune zone industriali (A. Battaglia). Nella città di Bologna si riconferma la presenza di alcune coppie nidificanti in area urbana (C. Fiorini).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

2 ind. Rimini Miramare, il 03/11-02 (C. Montevicchi *et al.* [O][E])*.

1 ind. Cervia (RA), il 02-02 (P. Dondini in Nicoli, 2024a). Su Ubird la data riportata è il 05-02, considerata la mancanza di documentazione fotografica e la difficoltà di identificazione della specie, il dato viene sospeso.

Strolaga maggiore *Gavia immer*

Viene segnalato nuovamente lo stesso ind. presso il litorale di Valle Ancona, Comacchio (FE), presente almeno dal 21-12-2023 (Pavesi *et al.*, 2024) al 23-03 (A. Tarozzi *et al.* [O][E]); 1 ind. Porto Corsini (RA), il 02/13-01 (M. Nalin *et al.*; Nicoli, 2024a)*. Si tratta rispettivamente della nona e decima segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b; Pavesi *et al.*, 2024).

Berta maggiore *Calonectris diomedea*

~ 8 ind. al largo di Cesenatico (FC), il 28-05 (M. Mambelli).

Berta grigia *Ardenna grisea*

1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), l'01-01 (E. Castellucci [O][E]; Nicoli, 2024a). Se la segnalazione dovesse essere accettata dalla COI si tratterebbe della prima segnalazione regionale nota.

Berta minore *Puffinus yelkouan*

2 ind. Porto Corsini (RA), il 1/3-05 (M. Scaffidi e M. Nalin [O]). Presso Lido di Spina, Comacchio (FE), 12 ind. il 09-09 (P. Melandri [O]) e 83 ind. il 22-11 (M. Bacci).

Cicogna nera *Ciconia nigra*

Concentrazione rilevante: 36 ind. presso Roccabianca (PR), il 28-09 (L. Venturini).

Segnalazioni in periodo invernale: 1 ind. Sorbolo (PR), il 13-01 (F. Lovisetto [O]); 1 ind. Torrile (PR), il 20-01 (G. Meo); 1 ind. a gennaio e nuovamente in dicembre presso Crevalcore (BO) (A. Ravagnani), lo stesso ind. osservato a Cento (FE) il 20-01 (A. Farioli).

Marangone minore *Microcarbo pygmaeus*

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): in provincia di Piacenza la specie nidifica in una sola garzaia (A. Battaglia); in provincia di Parma ~ 120 cp. in 5 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Reggio Emilia 25 cp. in un unico sito (Progetto Garzaie); in provincia di Modena 71 coppie nidificanti in 5 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie). Da considerarsi probabile la nidificazione nella garzaia dell'ex zuccherificio Eridania a Forlì (P.P. Ceccarelli [O]).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

Concentrazione rilevante: dal 04 all'08 agosto, presso alcuni prati allagati nel comune di Castelnovo di Sotto (RE), sono stati osservati fino a 420 ind. (D. Barbacini, S. Adorni, F. Si-

monazzi e A. Pavesi); 113 ind. Bassa Modenese, l'11-08 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): in provincia di Parma 19 cp. in 2 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Reggio Emilia >25 cp. in 4 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Modena 15 cp. in 2 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie).

Spatola *Platalea leucorodia*

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): in provincia di Parma >13 cp. in 2 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Reggio Emilia almeno una decina di cp. in 4 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Modena 64 cp. in 4 nuclei (N. Grattini, Progetto Garzaie). In provincia di Piacenza viene segnalata la possibile nidificazione nei pressi di una garzaia (A. Battaglia).

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 261 ind. Bassa Modenese, l'11-08 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): in provincia di Parma una settantina di cp. in 2 garzaie (Progetto Garzaie); in provincia di Reggio Emilia 8 cp. in 1 garzaia (Progetto Garzaie); in provincia di Modena 32 cp. in 7 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie).

Concentrazioni rilevanti: 325 ind. Bassa Modenese, il 19-05 (censimenti mensili Cisniar/SOM); circa 860 ind. in volo su Valle Zavelea, Comacchio (FE), il 20-12 (AsOER).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

Segnalazioni in periodo riproduttivo: 2 ind. Bassa Modenese, il 19-05 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Tarabusino *Botaurus minutus*

Segnalazione precoce: 1 ind. presso il parco urbano di Ferrara, il 29-02 (P. Melandri [O]).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. fiume Marecchia presso Rimini, il 19-01 (R. Corsi [O]); 1 ind. Valle Mandriole (RA), il 30-04 (M. Passarella [O]); 1 ind. Valli di Comacchio (FE), l'11-05 (P. Ugo [O]); 1 ind. osservato ripetutamente lungo il fiume Po presso Casalmaggiore (CR)/Colorno (PR), tra il 12-06 e l'08-07 (S. Balbo [O]); 1 ind. fiume Marecchia presso Rimini, il 06-08 (G. Colombo [O]).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Svernamento: 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), il 01/8-12 (P. Rovatti [O]); 17 ind. sono stati rilevati nel tratto di F. Po tra Isola Serafini e Roncarolo (PC), il 13-01 (censimenti IWC); 4 ind. San Giovanni in Persiceto (BO), l'01-12 (A. Ravagnani); 1 ind. Oasi LIPU Celestina, Campagnola Emilia (RE), l'08-12 (L. Bagni); 1 ind. Cesenatico (FC), il 29-12 (M. Bacci).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Segnalazione tardiva: 1 ind. osservato ripetutamente fino al 07-11 presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR) (P. Rovatti).

Airone bianco maggiore *Ardea alba*

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): in provincia di Piacenza un solo sito di nidificazione regolare con alcune cp. (A. Battaglia); 1 ind. in cova presso l'Oasi

LIPU di Torrile (PR), il 06-06 (A. Zanichelli); in provincia di Reggio Emilia 2 cp. in 1 garzaia in provincia di Modena 17 cp. in 4 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie).

Concentrazioni rilevanti per l'interno: 135 ind. nel comprensorio della Bassa Modenese il 14-07 (censimenti mensili Cisniar/SOM).

Airone guardabuoi *Ardea ibis*

Concentrazioni rilevanti: dormitorio di almeno 1300 ind. all'ex zuccherificio Eridania di Forlì (FC), il 04-09 (P.P. Ceccarelli [O]); ~ 850 ind. nel comprensorio della Bassa Modenese il 13-09 (censimenti mensili Cisniar/SOM); ~ 500 ind. Partecipanza Agraria di Nonantola (MO), il 26-09 (C. Chioffi [O]).

Airone rosso *Ardea purpurea*

Nidificazioni nelle province più interne (PC, PR, RE, MO): ~ 20 nidi attivi presso Caorso (PC) (A. Battaglia); ≥ 6 nidi attivi presso Sanguigna, Colorno (PR) (F. Simonazzi [O]); in provincia di Modena 16 cp. in 4 garzaie (N. Grattini, Progetto Garzaie).

Segnalazione tardiva: 1 ind. 1cy Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 16-11 (P. Pompili [F]).

Rondone pallido *Apus pallidus*

In provincia di Modena si conferma la frequentazione dei nuovi siti riproduttivi ritrovati negli anni passati (Pavesi *et al.*, 2023a): 4 ind. il 05-08 e 2 ind. il 23-08 a Sestola (MO) (G. Rossi [O]).

Barbagianni *Tyto alba*

1 ind. attribuito alla ssp. *guttata* è stato catturato e inanellato a Manzolino (MO), il 29-11 e 1 ind. a Nonantola (MO), il 12-12 (A. Ravagnani). Attraverso il medesimo progetto di inanellamento sono stati ripetutamente stimati durante i mesi estivi oltre 20-30 ind. a serata, in svariate località a cavallo del Bolognese occidentale e Modenese orientale (A. Ravagnani).

Assiolo *Otus scops*

Segnalazioni in periodo inusuale: 1 ind. registrato il 10-01 presso Porto Garibaldi, Comacchio (FE) (A. Ravagnani); 2 ind. Cesena, il 24-02 (M. Morganti [O]).

Gufo di palude *Asio flammeus*

Svernamento: ≥ 3 ind. Busseto (PR) nel mese di gennaio (M. Ravasini [F]). 4 ind. Sant'Agata Bolognese (BO), da metà novembre 2024 a metà marzo 2025 (M. Gardosi); 1 ind. Partecipanza Agraria di Nonantola (MO), il 25-12 (A. Ravagnani [O]); 1 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 29-12 (P. Nava [O]); 1-2 ind. nella Bonifica del Mezzano (FE) presenti in tutto il periodo invernale (AsOER).

Gufo reale *Bubo bubo*

In regione si conferma l'espansione della specie con 10-15 territori occupati, situati in aree collinari di diverse province (PC, RE, BO, RA, FC). In buona parte dei siti si è accertata la nidificazione con l'involto di giovani.

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Segnalazioni invernali: 1 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 09-01 (P. Venturi [O]).

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

1 ind. Imola (BO), l'11-10 (Leonardo degli Innocenti in Nicoli, 2025; [F])*

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Segnalazione tardiva: 1 ind. 1cy Oasi LIPU Torrile (PR), il 05-10 (A. Pavesi, M. Ceccanti).

Concentrazioni rilevanti: presso le Saline di Cervia (RA), 156 ind. in migrazione attiva il 28-04 e 92 ind. in migrazione attiva il 06-05 (E. Castellucci [E]).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. Val Tidone (PV)/ Val Trebbia (PC), il 29-05 (E. Vigo [E]); 1 ind. M. Ragola, Bedonia (PR), il 06-07 (O. Mercori [O]); 1 ind. il 12-08 Passo del Cerreto, Passo del Lagastrello, Passo del Cirone (RE-PR), recuperato il 09-07 nel territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana (LU) e curato presso il CRUMA LIPU di Livorno per intossicazione da piombo. Liberato il 10-08 nella Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella (LU), il 14-08 l'individuo si trovava già in Francia, nel Parco naturale regionale del Verdon (crumaweb.wordpress.com; rewildingappennines.com).

Biancone *Circaetus gallicus*

Nidificazione al di fuori delle province più occidentali dove la specie si riproduce regolarmente: nel forlivese osservato un adulto seguito da 1 juv. in località Collina, il 23-07 (M. Caprara), vista la data precoce si suppone la riproduzione non sia avvenuta lontana dal sito.

Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*

Segnalazione per l'interno: 1 ind. osservato ripetutamente fra Carpi e Mirandola (MO) dal 03-01 al 03-02 (G. Baroni, L. Tosatti *et al.* [O, F]).

Aquila minore *Hieraaetus pennatus*

1 ind. Pineta di San Vitale (RA), il 10-01 (M. Castellucci [O]); 1 ind. Goro (FE), il 27-04 (M. Cortemiglia [O]); 1 ind. Reggio nell'Emilia, il 30-04 (M. Fontanesi [O]); 1 ind. Polesine Parmense (PR), il 22/23-05 (E. Crepet); 1 ind. Borgo Val di Taro, il 04-09 (G. Sardella [O]); 1 ind. Oasi WWF dei Ghirardi, Borgo Val di Taro (PR), il 13-09 (G. Sardella [O]); 1 ind. Ostellato (FE), il 14-09 (P. Venturi [O]). Nel Ferrarese, presso il Bosco della Mesola e la Bonifica del Mezzano, osservati ripetutamente 1-3 ind. da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre.

Aquila imperiale *Aquila beliaca*

1 ind. 1cy Bonifica Stadiana (RA), il 12/21-01 (Censimenti IWC AsOER *et al.*; Nicoli, 2024)*. Si tratta della decima segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2023b).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Segnalazioni planiziali: 1 ind. osservato ripetutamente nella Bonifica del Mezzano (FE), si tratta dello stesso ind. rilasciato nel 2022 nel Bolognese (Pavesi *et al.*, 2023a; Pavesi *et al.*, 2024).

Astore *Astur gentilis*

Segnalazioni planiziali: 1 ind. in volo sul Po presso Casalmaggiore (CR)/Mezzano (PR), l'08-02 (S. Balbo [O]); 1 ind. Goro (FE), il 24-11 (P. Melandri [O]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

Svernamento: 1 ind. 2cy Zibello (PR), il 01-01/23-03 (L. Mattarozzi, P. Zucca e F. Roscelli). Individuo presente dal 6-12-2023 (Pavesi *et al.*, 2024; MATTAROZZI *et al.*, 2025).

1 ind. Saline di Cervia (RA), il 06-05 (E. Castellucci [O]); 1 ind. Jolanda di Savoia (FE), il 06-05 (M. Passarella [O]); 1 ind. immaturo presso "Le Magnane", Mirandola (MO), il 21-08 (L. Tosatti [O]).

Nibbio reale *Milvus milvus*

Segnalazioni invernali: 1 ind. San Secondo Parmense (PR), il 13-01 (A. Mucciolo); 1 ind. Ponte Taro (PR), il 13-01 (M. Fornasari [O]); 1 ind. Torrechiara (PR), il 05-12 (D. Ronconi [O]); 1 ind. Soragna (PR), l'11-12 (A. Sala [O]); 1 ind. Calendasco (PC), il 21-12 (S. Corbellini [O]); 2 ind. Guastalla (RE), il 22-12 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. Polesine Parmense (PR), il 24-12 (P. Zucca [O]); 1 ind. Gainago (PR), il 30-12 (M. Fornasari [O]); 1 ind. Manzolino (MO), il 27-12 (A. Ravagnani [O]); 2 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 27/28-12 (R. Gemmato [O]); 1 ind. Castelfranco Emilia (MO), il 28-12 (G. Rossi [O]). Nella Bonifica del Mezzano (FE), osservati ripetutamente alcuni ind. svernanti sia in gennaio che in dicembre, con un max. di 14 ind. il 30-12 (M. Nalin).

7 ind. in migrazione attiva presso Scandiano (RE), il 27-10 (M. Campani [F]).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Nidificazioni: 1 cp. con 2 pulli nel nido presso Luzzara (RE), il 06-06 (A. Pavesi); 1 cp. con 2 pulli nel nido presso Guastalla (RE), il 13-06 (A. Pavesi). Nel Parmense viene riportata la possibile nidificazione di una coppia nel comune di Montechiarugolo e una nel comune di Langhirano (D. Ronconi [O]); 1 cp. ha nidificato a Ozzano Taro (PR), nel Parco Regionale del Taro (R. Carini).

Concentrazioni rilevanti: 11 ind. Onferno (RN), il 12-08 (C. Montevecchi [O][E]); 54 ind. Pugliano (RN), il 20-08 (M. Zitelli).

Segnalazione invernale: 1 ind. Comacchio (FE), il 22-12 (L. Pini [O]).

Upupa *Upupa epops*

Segnalazioni tardive: 2 ind. Fontanili di Viarolo, Parma, il 06-10 (R. Scaccaglia); 1 ind. Pratospilla, Monchio delle Corti (PR), il 08-11 (B. Pasquali).

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Nidificazioni nelle province più interne (MO, RE, PR, PC): in provincia di Piacenza, accertata una nidificazione in zona collinare in Val Luretta (A. Battaglia) e altre tre in Val Tidone (A. Castellini). 1 ind. osservato lungo il Po a Monticelli d' Ongina il primo luglio 2024 (E. Crepet). In provincia di Parma stimate almeno 4-5 cp. nidificanti tra la Bassa Parmense e il Parco dello Stirone (F. Roscelli). In provincia di Reggio Emilia 1 cp. si è riprodotta con successo a Novellara (A. Costetti) e una è stata osservata ripetutamente in giugno a Poviglio (S. Adorni, D. Barbacini). In provincia di Modena rilevate 6 cp. nidificanti certe, a cui si aggiungono 5 probabili e 1 possibile (N. Grattini, Progetto Coracias).

Inoltre, in provincia di Forlì-Cesena, stimate 10-13 coppie nidificanti in zona collinare (M. Casadei *et al.*).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Nell'Appennino Parmense stimate almeno 2-3 coppie (Val Taro e Val Ceno) con segnalazioni in aumento (F. Roscelli). In provincia di Reggio Emilia viene segnalata una f. nel comune di Villa Minozzo, il 06-08 (M. Siena) e 1 ind. in Val d'Ozola nel comune di Ligonchio il 31-12 (G. Fontanesi [F]). Nel Piacentino si conferma la presenza in tutte le valli a partire dai 300/400 m s.l.m. (A. Battaglia). Nel Bolognese rinvenuto nidificante presso Lizzano in Belvedere (M. Caprara). Nel Modenese 1 ind. il 03-09 e 3 ind. il 27-12 presso Capanno Tassoni, Fanano (G. Rossi e F. Gardosi [O]); 1 ind. Sant'Annapelago, Pievepelago (MO), il 04-10 (G. Rossi [O]). Nel cesenate, confermata la presenza sul Monte Fumaiolo (M. Casadei [O]), dopo un'osservazione del 2023 (C.M. Giorgi).

Grillaio *Falco naumanni*

In provincia di Parma stimate 40-50 cp. nidificanti (F. Roscelli). In regione le colonie insediate risultano stabili e si conferma l'utilizzo di aree collinari in periodo post-riproduttivo da parte di numerosi individui non locali prima della migrazione in Africa, alcuni dei quali dotati di dispositivi GPS.

Concentrazioni rilevanti: Dormitorio di ~ 700 ind. in un'area pedecollinare del Forlivese, il 10-08 (C.M. Giorgi *et al.*).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

In provincia di Parma stimate ~ 130 cp. nidificanti (LIPU; gazzettadiparma.it); confermata la riproduzione di alcune cp. nella pianura Modenese e nel Ferrarese nella Bonifica del Mezzano.

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Osservazioni attribuite alla ssp. *calidus*: 1 ind. Finale Emilia (MO), il 16-03 (R. Gemmato [F]); 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 13-12 (L. Tosatti [O]).

Lanario *Falco biarmicus*

1 ind. Appennino Modenese, il 21-03 e poi nuovamente il 19-09 e 21-09 (E. Ruggeri); 1 ad. Val Marecchia (RN), il 01/06-04 (P.P. Ceccarelli).

Sacro *Falco cherrug*

1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), il 02-12 (M. Fenati in Nicoli, 2025)*.

Averla cenerina *Lanius minor*

Nel Parmense, ultima roccaforte regionale della specie, la popolazione nidificante di ~ 7 coppie è concentrata nella Bassa Ovest (F. Roscelli). 1 ind. Massa Fiscaglia (FE), il 22-05 (F. Piccolo [O]).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. Filo di Argenta (FE), il 26-04 (A. Ravagnani); 1 ind. ZSC-ZPS Sassoguidano-Gaiato, Pavullo nel Frignano (MO), il 28-05 e 15-06 (E. Ruggeri).

Gracchio corallino *Pyrhocorax pyrrhocorax*

2 ind. Pietra Parcellara, Bobbio (PC), il 04-01 (A. Battaglia).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

2 ind. Trai, Colorno (PR), il 27-01 (F. Lovisetto [O]); 5 ind. Zibello (PR), il 05-02 (F. Roscelli); 2 ind. Sala Baganza (PR), il 25-02 [O]; 1 ind. Colorno (PR), il 03-11 (F. Lovisetto [O]);

13 ind. Zibello, l'11-11 (D. Ronconi [O]); 2 ind. Polesine Parmense (PR), l'11-11 (D. Ronconi [O]).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Nel ravennate, confermata la riproduzione nel Parco della Vena del Gesso Romagnola (M. Bacci e C.M. Giorgi) e osservato un tentativo di nidificazione di una seconda coppia al confine con il forlivese (A. Amaretti e S. Ghiselli).

Cornacchia *Corvus corone*

Segnalazioni di Cornacchia nera *Corvus c. corone*: 1 ind. Collecchio (PR), il 09-01 e 29-02 (D. Ronconi [O]); 1 ind. Campo di Marte, Reggio nell'Emilia, il 29-02 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. Mezzani (PR), l'01-05 (F. Lovisetto [O]); 1 ind. Oasi WWF dei Ghirardi, Borgo Val di Taro (PR), il 20-09 e 21-10 (G. Sardella [O]); 1 ind. Parma, il 01-10, 08-12 e 12-12 (D. Ronconi [O]); 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), il 23-11 (R. Gemmato [O]); 1 ind. Mezzano Inferiore (PR), il 07-10 (F. Lovisetto [O]); 1 ind. San Geminiano, Montechiarugolo (PR), il 18-12 (D. Ronconi [O]); 1 ind. Polesine Parmense (PR), il 21-12 (F. Simonazzi [O]).

Basettino *Panurus biarmicus*

Si conferma l'unico sito riproduttivo regolare a livello regionale nelle Valli di Argenta (FE), con la presenza di alcune coppie (AsOER).

Cappellaccia *Galerida cristata*

Alcuni cantori rilevati nel piacentino nei comuni di Castelvetto Piacentino e Monticelli d'Ongina (B. Riboni; E. Crepet [O]); 3 ind. Torrile (PR), il 12-05 (B. Riboni [O]); 2 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), il 06-04 e il 29-04 (R. Gemmato [O]); 2 ind. Reno Finalese (MO), il 31-05 e il 17-07 (R. Gemmato [O]).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

3 ind. Villanova (FC), il 02-05 (M. Bacci); 1 ind. Valli Finallesi (MO), il 14-05 (R. Gemmato [O]) e 1 ind. nei pressi di Nonantola (MO), il 17-05 (L. Tosatti [O]); 1 ind. in canto, Valle Pega, Comacchio (FE), il 27-05 (G. Speranza [O]).

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Segnalazione in località inusuale: 3 ind. Casse di Espansione dell'Enza, Montechiarugolo (PR), il 14-12 (M. R. Lamattina [O]).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

Segnalazione tardiva: 1 ind. "Le Melegghine", Finale Emilia (MO), il 26-10 (R. Gemmato [O]).

Topino *Riparia riparia*

Nel parmense nidificante presso il frantoio di Collecchio con almeno 100 nidi (R. Carini) e in una cava di sabbia a Zibello con almeno 12 nidi (F. Roscelli). Probabile anche nidificazione nel Taro a Viarolo (F. Roscelli).

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Segnalazione attribuita a *Aegithalos c. caudatus*: 3 ind. Reggio nell'Emilia, il 15-02 (S. Zanella [F]).

Luì di Hume *Phylloscopus humei*

1 ind. Montecchio Emilia (RE), il 20-01 (M. Gustin; Nicoli, 2024a). Si tratta della quinta segnalazione nota a livello regionale (Pavesi *et al.*, 2024).

Luì piccolo *Phylloscopus collybita*

Segnalazioni attribuite a *Phylloscopus collybita tristis*: 1 ind. laghi del Marecchia presso Rimini (RN), il 19-01 (R. Corsi [O]); 1 ind. Saline di Cervia (RA), il 03-03 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]); 1 ind. Bologna, il 20-03 (A. Tarozzi [O]); 2 ind. Argenta (FE), il 29-03 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]).

Occhiocotto *Curruca melanocephala*

Vengono riportate le segnalazioni per le province di MO, RE, PR e PC dove la specie risulta tuttora localizzata e per le quali le conoscenze sono scarse. In provincia di Modena 3 ind. nei calanchi sopra Fiorano Modenese, il 17-02 (D. Lopez). In provincia di Reggio Emilia la specie viene segnalata in periodo riproduttivo in due località nel comune di Scandiano in aprile e maggio (M. Campani [F]; N. Larroux, A. Pavesi). In Provincia di Parma sono segnalati, ripetutamente durante tutto l'anno, alcuni ind. in aree calanchive del comune di Lesignano de' Bagni (F. Lovisetto *et al.* [O]).

Sterpazzolina di Moltoni *Curruca subalpina*

Segnalazione in località inusuale: 1 ind. presso la Picasso Food Forest, periferia est di Parma, il 27-04 (F. Lovisetto [O]).

Sterpazzolina *Curruca cantillans*

Segnalazioni in località inusuali: 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), il 14-04 (F. Simonazzi [O]).

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

1 ind. Torriana (RN), il 18-06 (S. Brigidi [O]); 1 ind. Riserva di Sassoguidano, Pavullo nel Frignano (MO), il 29-07 (E. Ruggeri [O]).

Picchio muraio *Tichodroma muraria*

Segnalazioni in località inusuali: 1 ind. presso un'area calanchiva nel comune di Castellarano (RE), il 25-01 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. Strabatenza (FC), il 05-02 (S. Brigidi [O]); 1 ind. Buda, Medicina (BO) a 6 m s.l.m., il 26-02 ([F]); 1 ind. nel centro di Mirandola (MO) a 18 m s.l.m., il 07-11 (R. Gemmato [F]).

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Segnalazioni in località pianiziali, a nord della Via Emilia: 1 ind. Sissa (PR), l'01-01 (A. Bolsi); 1 ind. Luzzara (RE), il 15-01 e il 26-11 (A. Pavesi); 1 ind. in canto presso l'Oasi de Pinedo, Caorso (PC), il 05-03 (A. Ambrogio); 1 ind. in canto presso Guastalla (RE), aprile-maggio (M. Fontanesi [O]); 1 ind. in canto nell'area periurbana di Correggio (RE), il 26-04 (M. Gustin [O]). Presso Punta Alberete, Ravenna, è stata accertata la nidificazione di 1 cp. nel mese di giugno (M. Bacci, F. Borghesi).

Tordela *Turdus viscivorus*

Confermata la nidificazione nel Ferrarese: osservato 1 ind. con imbeccata presso Prato Pozzo il 21-05 (F. Lovisetto, E. Mero [O]).

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), il 08-04 (M. Tassinari [O]); 2 ind. Passo Bocca di Massa, Villa Minozzo (RE), il 12-10 (T. Campedelli [O]); 1 ind. Lago Scaffaiolo (MO), il 16-11 (G. Obino [F]).

Nidificazione: nella Foresta di Campigna (FC), osservati 1 m. in canto e successivamente 1 cp. con imbeccata, il 29-04/20-06 (M. Bacci e P.P. Ceccarelli).

Pigliamosche *Muscicapa striata*

Segnalazione tardiva: 1 ind. Oasi LIPU Celestina, Campagna Emilia (RE), il 24-10 (L. Gennari [O]).

Usignolo maggiore *Luscinia luscinia*

1 ind. inanellato presso l'Oasi LIPU di Torrile (PR), il 21-08 (M. Gustin)*.

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 ind. Macerone (FC), il 22-04 (E. Castellucci e M. Castellucci [O]).

1 m. è stato fotografato a San Pietro in Casale (BO), il 15-06 (M. Cerruti). Le informazioni in nostro possesso non sono sufficienti per considerare l'esemplare come nidificante, tuttavia va annoverato tra i recenti dati planiziali della specie in periodo riproduttivo, come osservato anche in Veneto da Nardotto *et al.* (2024).

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Segnalazione tardiva: 1 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), il 20-10 (A. Tarozzi [O]).

Codirossone *Monticola saxatilis*

Nel Forlivese, dove non si hanno prove di nidificazione dalla fine del secolo scorso (Gellini e Ceccarelli, 2000; Ceccarelli e Gellini, 2011; Ceccarelli *et al.*, 2019), è stato osservato 1 m. presso Montalto di Premilcuore (FC), il 24-04 (F. Grazioli); 1 m. presso Burraia (FC), il 29-04 (M. Bacci); 1 ind. presso il Monte Castellaccio (FC), il 22-08 (A. Amaretti [O]).

Passero solitario *Monticola solitarius*

1 m. M. Perticara (RN), il 23-01/16-11 (P.P. Ceccarelli *et al.* [O]); 1 m. San Leo (RN), il 17-04 (S. Brigidi e C.M. Giorgi); 1 m. Monte Gregorio (RN), il 22-06 (S. Brigidi [O]); 1 ind. Pietra di Bismantova, Castelnuovo ne' Monti (RE), viene segnalato a partire dal 22-12 (M. Campani, J. Travis [F]).

Stiaccino *Saxicola rubetra*

Segnalazione tardiva: 1 ind. documentato nella campagna a ovest di Parma, il 23-11 (D. Roconi [O]). Concentrazione rilevante: 26 ind. Prati della Burraia, Santa Sofia (FC), il 29-04 (M. Bacci).

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), l'01-05 (R. Gemmato [O]).

Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Osservato 1 m. presso San Benedetto in Alpe (FC) nell'unico sito riproduttivo attualmente conosciuto in Romagna, il 17-06 (C. Ciani e C.M. Giorgi [O]).

Sordone *Prunella collaris*

Svernante regolare presso la Pietra di Bismantova, Castelnuovo ne' Monti (RE), con >15 ind. in gennaio e >20 ind. in dicembre (G. Fontanesi [O]); >12 ind. M. Cusna, Villa Minozzo (RE), il 16-11 e alcuni ind. uditi presso il M. Ventasso, Collagna (RE), il 07-12 (G. Fontanesi [O]). Nel parmense 1 ind. presso il M. Marmagna, Corniglio, il 30-12 (P. Rontani). Nel piacentino 10 ind. loc. Barchi, Ottone (PC), il 10-01

(A. Battaglia). Inoltre: 1 ind. Lago di Ridracoli (FC), il 28-01 (L. Agostini [O]); 1 ind. Lago Scaffaiolo (MO), il 03-02 (G. Obino [F]).

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

2 ind. San Leo (RN), il 04-01 (M. Dal Zotto [O]) presenti dal 26-11-23 (Pavesi *et al.* 2024); 2 ind. M. Aquila, Corniglio (PR), l'01-01 (M. Valenti); ~ 20 ind. M. Cusna, Villa Minozzo (RE), il 16-11 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. sul crinale nei pressi del Monte Ischia, Collagna (RE), il 15-12 (A. Corazza [N]).

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Segnalazioni nel Ravennate dove, seppur sia segnalata come nidificante, la specie ha ancora una distribuzione poco nota: 5 ind. Savarna (RA), il 28-02 (F. Borghesi [O]); 2 ind. Tanton (RA), il 29-04 e 3 ind. Lido di Dante (RA), il 07-05 (M. Passarella [O]).

Ballerina bianca *Motacilla alba*

Segnalazione attribuita a *Motacilla alba yarrellii*: 1 ind. documentato nel comune di Mezzani (PR), il 02-03 (F. Lovisetto).

Calandro maggiore *Anthus richardi*

1 ind. Ravalle, Ferrara, il 04-01 (P. Melandri [O][E]), presente dal 29-11-23 (P. Melandri; Pavesi *et al.*, 2024).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

Presso le Saline di Cervia (RA), fino a 13 ind. il 23-04 (E. Castellucci [O][E]).

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Si conferma la nidificazione di >2 cp. presso l'Oasi WWF dei Ghirardi, dove sono stati osservati alcuni juv. dipendenti dagli ad. (G. Sardella).

Organetto *Acanthis flammea*

Acanthis flammea cabaret: Fino a 11 ind. osservati ripetutamente sulla spiaggia di Lido degli Estensi, Comacchio (FE), fino al 12-02 (M. Tassinari, N. Adestri *et al.* [O]). La prima segnalazione risale al 25-11-23 (Pavesi *et al.*, 2024); 1 ind. Centro abitato di Mirandola (MO), il 29-02 (R. Gemmato [O][F]).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

1 ind. Porto Corsini (RA), il 10/28-01 (A. Piccinini *et al.* [O][E]; Nicoli, 2024a)

Strillozzo *Emberiza calandra*

Concentrazione rilevante: ~ 95 ind. Valle di Gruppo, Carpi (MO), il 03-02 (G. Zuffi [O]).

Ortolano *Emberiza hortulana*

Nidificazioni: nel Parmense si conferma la presenza in zone calanchive di Val Parma e Val Taro (F. Roscelli) e nella RN dei Ghirardi (G. Sardella). Nel Piacentino segnalate almeno 3 cp. in Alta Val Luretta e 3 cp. in Media Val Trebbia (A. Ambrogio, A. Battaglia).

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Nidificazioni: in Provincia di Reggio Emilia l'unico sito noto è Passo Praticiano-Passo Scalucchia, Ventasso, dove si stimano minimo 3 cp. (L. Bagni). In provincia di Parma alcune cp. presenti tra Passo Centocroci e Passo della Cappelletta, Varese Ligure (SP) - Albareto (PR) (F. Lovisetto, D. Ronconi [O]).

In provincia di Modena segnalato durante il periodo riproduttivo nel comune di Pavullo nel Frignano (MO) (E. Ruggeri). Nel Forlivese almeno due m. in canto sul M. Fumaiolo, Verghereto (FC), il 13-06/24-06 (M. Castellucci e C.M. Giorgi [O]). Nel Riminese 1 m. in canto sul M. Carpegna, Motecopolo (RN), il 28-07 (C. Fiorini [O]).

SPECIE INCLUSE NELLA CATEGORIA AERC “E” (cfr. Baccetti *et al.*, 2014)

Oca indiana *Anser indicus*

1-5 ind. segnalati in diverse zone umide della pianura modenese: “La Francesa”, Carpi (MO), il 04-01 e 16-01 (A. Orlandi [O], censimenti IWC); Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), dal 01-02 al 10-02 (G. Padovani, R. Gemmato [O]); ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 24-02 (L. Gennari [O]); Valli finalesi e “Le Meleghine”, fra il 25-02 e il 10-05 (R. Gemmato e A. Pasqua [O]); Riserva delle Casse di espansione del fiume Secchia (MO-RE), il 30-04 (P. Nava [O]). Nel Bolognese 1 ind. presso i bacini dello zuccherificio di Minerbio, 19-06 (M. Bacci); 1 ind. osservato ripetutamente da gennaio a giugno nel comune di Argenta (FE) (M. Castellucci *et al.* [O]).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 cp. Correggio (RE), il 01/18-01 (G. Fontanesi [O]); 1 ind. nei pressi di Castelfranco Emilia (MO), il 26-08 (L. Tosatti [O]).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. Rocca delle Caminate (FC), il 07-08 (L. Agostini e C.M. Giorgi [O]); 1 ind. “Le Meleghine”, Finale Emilia (MO), il 28-09 (R. Gemmato [O]).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

Le poche osservazioni sono state fatte nella sola provincia di Bologna e non sono segnalati casi di nidificazione.

Parrocchetto di Alessandro *Palaeornis eupatria*

1 ind. Reggio nell'Emilia, il 21-06 (M. Fontanesi [O]).

IBRIDI

Oca selvatica *Anser anser* x Oca indiana *Anser indicus*

1-2 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), fra il 05-01 e il 15-11 (L. Tosatti *et al.* [O]); 1 ind. ZSC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO) fra il 30-01 e il 20-02 (L. Lipparini, G. Leoni *et al.* [O]).

Fenicottero del Cile *Phoenicopterus chilensis* x Fenicottero americano *Phoenicopterus ruber*

Osservazioni ripetute di 1 individuo tra le saline e valli di Comacchio e Boscoforte, Argenta (FE) (censimenti mensili AsOER). L'individuo, sprovvisto di alcun tipo di marcaggio, presenta caratteri intermedi tra le due specie, per questo è stato identificato come ibrido.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano: Simona Adorni, Leo Agostini, Vincenzo Alfano, Andrea Ambrogio, Alberto Amaretti, Luca Artoni, Giovanni Arveda, Eros Ballardini, Simone Balbo, Germano Bale-

strieri, Diego Barbacini, Guido Baroni, Emanuela Battistini, Alessandro Berlusconi, Sandro Bertè, Angelo Bolsi, Laura Bonanno, Dante Bonazzi, Luca Bonomelli, Fabrizio Borghesi, Fabrizio Borghesi, Stefano Brigidi, Massimo Campani, Massimo Caprara, Renato Carini, Maurizio Casadei, Andrea Castellini, Maurizio Castellucci, Enrico Castellucci, Michael Ceccanti, Pier Paolo Ceccarelli, Marco Cerruti, Claudio Chioffi, Carlo Ciani, Giuseppe Colombo, Sauro Contini, Alessandro Corazza, Simona Corbellini, Roberta Corsi, Marco Cortemiglia, Massimiliano Costa, Alberto Costetti, Emanuele Crepet, Stefano Donello, Federico Fanesi, Roberto Fantini, Mauro Fenati, Lorenzo Ferrari, Domenico Festa, Marco Fontanesi, Giovanni Fontanesi, Gianni Galeotti, Enrico Ganassi, Fabio Gardosi, Raffaele Gemmato, Giuliano Gerra, Stefano Ghiselli, Massimo Gigante, Luigi Gennari, Nunzio Grattini, Marco Gustin, Maria Rita Lamattina, Nicola Larroux, Giorgio Leoni, Lino Lipparini, Fabio Lovisetto, Matteo Mambelli, Mirco Maselli, Lucia Mattarozzi, Pietro Melandri, Gabriella Meo, Erika Mero, Luigi Molinari, Cristian Montevecchi, Michelangelo Morganti, Alessandro Mucciolo, Moreno Nalin, Edoardo Nardelli, Patrizia Nava, Giorgio Nini, Gabriele Obino, Andrea Orlandi, Giorgio Padovani, Maurizio Parenti, Paolo Pasini, Angelo Pasqua, Benedetta Pasquali, Menotti Passarella, Andrea Piccinini, Fabio Piccolo, Lorenzo Pini, Carlo Poiani, Attilio Poletti, Paolo Pompili, Stefano Rambelli, Maurizio Ravasini, Bassano Riboni, Lorenzo Rigacci, Giacomo Rocca, Daniele Ronconi, Giuseppe Rossi, Paolo Rovatti, Ettore Ruggeri, Alfio Sala, Guido Sardella, Raffaella Scaccaglia, Michele Scaffidi, Enrico Selmi, Marco Siena, Fabio Simonazzi, Giuseppe Speranza, Francesca Sofri, Andrea Tarozzi, Massimo Tassinari, Lorenzo Tosatti, Justin Travis, Danilo Trombin, Monica Valenti, Piero Venturi, Lorenza Venturini, Enzo Vigo, Michel Zanata, Stefano Zanella, Andrea Zanichelli, Mirco Zitelli, Paolo Zucca, Giorgio Zuffi. Si desiderano ringraziare particolarmente i volontari del GLC Reggio Emilia-Carpi, i volontari del GLC Parma, i volontari del Progetto Garzaia ed i volontari dei censimenti mensili Cisnar/SOM.

BIBLIOGRAFIA

- BACCETTI N., FRACASSO G. & GOTTI C., 2014. La lista CISO COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta* 38: 1-21.
- BACCETTI N., FRACASSO N. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. *Avocetta* 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en.
- CECCARELLI P.P. E GELLINI S. (a cura di), 2011. Atlante degli Uccelli nidificanti nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (2004-2007). Filograf Litografia - Forlì.
- CECCARELLI P.P., GELLINI S., LONDI G. E AGOSTINI N. (a cura di), 2019. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna (2012-2017). P.N. delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna.

- GELLINI S., CECCARELLI P.P., 2000 - Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna (1995-1997). Province di Forlì-Cesena e Ravenna: 1-212.
- GIANNELLA C., MINELLI F. & RABACCHI R., 1996. Resoconto ornitologico modenese anni 1989-1995. *Picus*. 22: 115-130.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2003. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna. Anno 2002. *Picus*. 29: 9-18.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2004. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna, anno 2003: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. *Picus*. 30: 97-109.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (red.), 2006. Resoconto ornitologico dell'Emilia-Romagna Anno 2004: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. *Picus*. 32: 9-22.
- MATTAROZZI L., ROSCELLI F., ZUCCA P. & PAVESI A. Pallid Harrier *Circus macrourus* (N. 7). In: Chiatante G. (ed.), 2025. BIRD NEWS. Avocetta 48: 5-6. <https://doi.org/10.30456/AVO.29872>
- NARDOTTO A., LUCHETTA A., PANZARIN L. F., PASTRES M. & TAIARIOL P. L., 2024. Recent reproductive evidence of collared flycatcher (*Ficedula albicollis*) in two lowland areas of northeastern Italy. *Rivista Italiana Di Ornitologia*, 94(2). <https://doi.org/10.4081/rio.2024.813>
- NICOLI A., 2024a. Segnalazioni dall'Italia. *Quaderni di Birdwatching* 44: 46-50.
- NICOLI A., 2024b. Segnalazioni dall'Italia. *Quaderni di Birdwatching* 45: 52-55.
- NICOLI A., 2025. Segnalazioni dall'Italia. *Quaderni di Birdwatching* 46: 64-67.
- PAVESI A., FIORINI C., RAVAGNANI A., FARIOLI A., BACCI M., BAGNI L., BATTAGLIA A., CECCARELLI P. P., DE FAVERI A., GIANNELLA C., ROSCELLI C. & TINARELLI R., 2023a. Resoconto ornitologico per la Regione Emilia-Romagna - Anno 2022. *Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara*, 11: 47-62.
- PAVESI A., FIORINI C., RAVAGNANI A., FARIOLI A., BAGNI L., BATTAGLIA A., BORGHESI F., CECCARELLI P. P., DE FAVERI A., GIANNELLA C., ROSCELLI F. & TINARELLI R., 2023b. Checklist degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al 31 dicembre 2021, con note e commenti delle specie di maggiore interesse a livello regionale. 70 pp. <https://www.asoer.org/>.
- VOLPONI S. 2024. Monitoraggio degli uccelli acquatici nidificanti nelle Valli di Comacchio (FE) e delle colonie di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nelle zone umide del Parco Delta del Po. Stagione riproduttiva 2024. Convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po per la collaborazione allo studio e al monitoraggio della fauna selvatica nel territorio di competenza del Parco e nelle aree limitrofe funzionalmente collegate da un punto di vista dell'ecologia della specie. ISPRA - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, Relazione interna, 36 pp.

SITOGRAFIA

- <https://www.ebnitalia.it/>
- <https://www.facebook.com/groups/273472081878933> Gruppo Facebook "Emilia Romagna birding".
- <https://www.facebook.com/profile.php?id=100092126143665> Gruppo Facebook "CARC Natura - Oasi Le Melegghine"
- <https://www.inaturalist.org> (ultima consultazione in data 29-08-2025)
- <https://www.ornitho.it/index.php> (AA. VV., ultima consultazione in data 29-08-2025)
- https://www.parmavisiteguide.it/parmabw/bw/parmabw_confr.pdf
- <https://www.laprovinciacr.it/video/cronaca/445578/sul-po-arrivano-i-fenicotteri.html>
- <https://crumaweb.wordpress.com/2024/08/06/torna-in-liberta-un-grifone-colpito-da-saturnismo/>
- <https://rewilding-apennines.com/it/news/il-grifone-tornato-in-liberta-e-arrivato-in-francia/>
- <https://www.gazzettadiparma.it/bassa/2024/07/14/news/il-falco-piedi-rossi-e-tornato-nella-sua-bassa-799603/>

