

In tabella vengono elencate, nella prima colonna, tutte le specie di cui sono presenti in Collezione esemplari provenienti dalle Pinete di Ravenna e dalle Foreste Casentinesi. Sono evidenziate in campo grigio le specie rinvenute in entrambe le aree. Di ciascuna specie viene indicato, nelle colonne verticali, il numero di esemplari della Collezione provenienti dai diversi settori sia delle Pinete di Ravenna che delle Foreste Casentinesi, individuabili in capo a ogni colonna dalle seguenti sigle (da sinistra a destra): Pinete di Ravenna: PSV = Pineta di San Vitale; PC = Pineta di Classe; AA/SD: esemplari provenienti da altre stazioni (Bardello, Punte Alberete) o senza dati precisi di località; Foreste Casentinesi: ST = La Stretta; AAW = altre stazioni del settore occidentale (da Monti Gemelli a Passo della Calla); CU = Cullacce; SF = Sasso Fratino (incl. Poggio Scali, Pian del Pero e Fonte del Maresciallo); LA = Foresta della Lama; AAE = altre stazioni del settore orientale (dal Monte Penna a Camaldoli al Passo dei Mandrioli); SD = esemplari raccolti nell'area del Parco ma senza dati precisi di località.

[illegible]

[illegible]

<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)	2		173								
<i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767)	56						1	19			
<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)					1	4		50			
<i>Saphanus piceus</i> (Laicharting, 1784)				6	20						37
<i>Semanotus ruscicus</i> (Fabricius, 1777)	2										
<i>Stenopterus ater</i> (Linnaeus, 1767)	1										
<i>Stenostola dubia</i> (Schrank, 1776)						3		10			
<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)		2						1			
<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)					1	2	2	17			
<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)					20	6	1	28			
<i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758)									1		
<i>Xylotrechus antilope</i> (Schönherr, 1817)								1			